

NOMBRE COMERCIAL	COMPOSICIÓN	ESPECIES DE DESTINO	VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA	PRES.
HORMONALES				
OXIVEEX Solución inyectable	Oxitocina 10 UI Excipientes csp 1 ml	Cerdas Vacas Yeguas Ovejas Cabras	Vacas y yeguas: Vía intramuscular o subcutánea: 3 a 5 ml. Vía intravenosa lenta: 1,5 a 3 ml. Cerdas y ovejas: Vía intramuscular o subcutánea: 2 a 3 ml Vía intravenosa lenta: 1 a 1,5 ml	50 ml
TESTOSTERONA-E Solución oleosa inyectable	Testosterona (propionato) 25 mg Vitamina E acetato 50 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Equino Ovino Caprino	Vía intramuscular Bovinos y equinos: 10 ml/animal. Porcinos, ovinos y caprinos: 2 ml/animal. Administrar 2 veces por semana durante 1 a 3 semanas.	50 ml
SUSPENSIONES INTRAMAMARIAS				
MASTIVEEX CON CEFALOSPORINA Suspensión intramamaria	Ceftiofur clorhidrato 125 mg Dexametsona (21-fosfato sódico).....2 mg Excipientes csp 10 g	Bovino	Una jeringa por cuarterón afectado cada 24 horas por un mínimo de 2 días	10 g
MASTIVEEX DRY Suspensión intramamaria	Cloxacilina (benzatina) 500 mg Excipientes csp 5 g	Bovino Ovino Caprino	Administrar la totalidad del contenido de la jeringa en cada cuarterón en dosis única después del último ordeño.	5 g
MASTIVEEX LACTACIÓN Suspensión intramamaria	Cloxacilina (sódica) 200 mg Ampicilina (sódica) 75 mg Excipientes csp 10 g	Bovino Ovino Caprino	Una jeringa en cada cuarterón afectado cada 12 horas, durante 3 ordeños consecutivos.	10 g 5 g
FORMAS FARMACÉUTICAS ORALES				
POLVOS PARA ADMINISTRACIÓN ORAL				
AMOXICILINA 50% REVEEX Polvo oral	Amoxicilina (trihidrato) 500 mg Excipientes csp 1 g	Porcino Aves	Administración vía oral en el agua de bebida Pollos de engorde: 15 mg/kg p.v./día, durante 5 días Patos de engorde: 20 mg/kg p.v./día durante 3 días Pavos de engorde: 15 a 20 mg/kg p.v./día durante 5 días Porcino: 20 mg/kg p.v./día durante 4 días	200 g 1 kg 25 x 1 kg
COLISTINA REVEEX 2050000 UI/g Polvo oral	Colistina sulfato 2050000 UI Excipientes csp 1 g	Bovino Porcino Pollos Pavos	Administración vía oral en el agua de bebida Terneros y cerdos: 0,5 g/10 kg p.v./día, durante 3 días. Pollos y pavos: 0,06 g/kg p.v./día, durante 3 días	200 g 1 kg 25 x 1 kg
DOXICICLINA 50 Polvo oral	Doxiciclina (hiclato) 500 mg Excipientes csp 1 g	Bovino Porcino Aves	Administración por vía oral en el agua de bebida Aves: 30 mg/kg p.v./ día, durante 3-5 días Cerdos de engorde: 0,2 g/10 kg p.v./día, durante 5 días Terneros: 0,2 g/10 kg de p.v./día durante 5 días	200 g 1 kg 25 x 1 kg
LINCOMICINA 40 Polvo oral	Lincomicina (hidrocloruro) 400 mg Excipientes csp 1 g	Porcino Aves	Administración por vía oral en el agua de bebida Porcino: 12,5 – 25 mg/kg p.v./día de 5 a 10 días. Aves: 7,5- 15 mg /kg p.v./día, durante 7 días.	100 g 1 kg
TYLOSINA 500 REVEEX Polvo oral	Tilosona (tartrato) 500 mg Excipientes csp 1 g	Bovino Porcino Aves	Administración por vía oral en el agua de bebida Terneros: 20-40 mg producto/kg p.v. cada 12 horas durante 7-14 días Cerdos: 40 mg producto/kg p.v. durante 10 días Pollos: 150-200 mg producto/kg p.v. durante 3-5 días	100 g 250 g 500 g 1 kg
SOLUCIONES Y SUSPENSIONES PARA ADMINISTRACIÓN ORAL				
ALBENDEX 10% Suspensión oral	Albendazol 100 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Ovino Caprino	Vía oral Nematodos gastrointestinales, estróngilos pulmonares y cestodos: 7,5 ml/100 kg p.v. en dosis única Fasciolas adultas: 10 ml/100 kg p.v. en dosis única	200 ml 1 L 1 galón
AMPROLIUM 40% REVEEX Solución oral	Amprolium (clorhidrato) 400 mg Excipientes csp 1 ml	Aves	Administración por vía oral en el agua de bebida 0,5 ml/10 kg p.v./día durante 5-7 días	500 ml 1 L 5 L
BRONCOVEEX Solución oral	Bromhexina (clorhidrato) 10 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Porcino Equino Aves Ovino Caprino	Administración por vía oral en el agua de bebida Aves 100 ml en 1000 L de agua Cerdos: 0,2 a 0,5 ml/animal Lechones: 0,1 a 0,25 ml/animal Beceiros: 0,3 a 0,7 ml/ animal Bovinos y equinos: 1 a 1,5 ml / animal Administrar durante 5 días.	1 L 1 galón
CARNIVIT AMINO Solución oral	Vitamina B1 clorhidrato 2,85 mg; Vitamina B2-5 fosfato sódico 3,2 mg; Vitamina B6 clorhidrato 1,8 mg; Biotina 0,05 mg; Nicotinamida 10 mg; Dexpantenol 5 mg; Vitamina A 325 UI; Vitamina D3 100 UI; Vitamina 12,5 mg; Vitamina E acetato 4,5 mg; L-Carnitina clorhidrato 12,5 mg; Betaina 25 mg; L-Arginina 3,75 mg; L-Glicina 7,5 mg; L-Lisina clorhidrato 12,9 mg; DL-Metionina 5,5 mg; L-Triptófano 1,8 mg; L-Treonina 3,2 mg; Excipientes c.s.p. 1 ml	Bovino Equino Porcino Aves Ovino Caprino Conejos	Vía oral, en el agua de bebida. Todas las especies: 2 ml/L de agua durante 5 días consecutivos	100 ml 1 L 18 L
COCXIVET Solución oral	Toltrazurilo 25 mg Excipientes csp 1 ml	Aves	Administración por vía oral en el agua de bebida 1 ml/l de agua durante 2 días	100 ml 1 L 1 galón
DICLAZURIL 2,5% Solución oral	Diclazurilo 25 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Ovino Aves Conejos	Administración por vía oral en el agua de bebida Bovino, ovino, caprino: 1 ml/25 kg p.v. en dosis única Conejos: 0,002 ml/kg p.v. en dosis única Aves: 0,3 mg /kg p.v./día durante 3 días	200 ml 1,5 L 1 galón

NOMBRE COMERCIAL	COMPOSICIÓN	ESPECIES DE DESTINO	VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA	PRES.
DOXYVEEX 200 MG/ML Solución oral	Doxiciclina (hiclato) 200 mg Excipientes csp 1 ml	Porcino Pollos Pavos	Administración por vía oral en el agua de bebida Pollos y pavos: 0,05-0,1 ml producto/kg p.v. durante 3-5 días Porcino: 1 ml producto/20 kg p.v. durante 5 días	1 L 1 galón 5 L
ENROFLOXACINA 20% REVEEX Solución oral	Enrofloxacinna 200 mg Excipientes csp 1 ml	Aves	Administración por vía oral en el agua de bebida 0,05 ml /kg de p.v./día por día de 3 a 5 días.	250 ml 1 L 1 galón
FENIVEEX Solución oral	Florfenicol 100 mg Excipientes csp 1 ml	Porcino Aves	Administración por vía oral en el agua de bebida 1 ml/L agua de bebida/día de 3 a 5 días	1 L 1 galón
HEPATOVEEX SOLUCIÓN ORAL Solución oral	Lisina clorhidrato 20 mg Betaina 60 mg Colina cloruro 75 mg DL-Metionina 11,5 mg Sorbitol 350 mg Extracto De Alcachofa 10 mg Taurina 12,5 mg Carnitina Clorhidrato 25 mg Vitamina B12 10 µg Excipientes csp 1 ml	Aves Cerdos Bovinos Ovinos Caprinos Camélidos Equinos Conejos	Vía oral, en el agua de bebida. Aves y cerdos: 1 ml/L de agua durante 5 días consecutivos Bovinos y equinos: 1 ml/5-10 kg p.v. durante 5 días consecutivos Ovinos, caprinos, camélidos, conejos: 1ml/2.5-5 kg p.v. durante 5 días consecutivos.	1 L 5 L 25 L
HIDRO REX VITAL AMINOÁCIDOS Solución oral	Vitamina B1 5 mg; Vitamina B2 10 mg; Vitamina B6 3 mg; Vitamina B12 30 µg; Ácido Nicotínico 20 mg; Pantotenato cálcico 10 mg; Vitamina C 50 mg; Vitamina K3 5 mg; Ácido Fólico 1 mg; Vitamina A 20.000 UI; Vitamina D3 5.000 UI; Vitamina E 9 mg; Ácido Aspartico 14,5 mg; Treonina 6,4 mg; Serina 6,6 mg; Ácido glutámico 26,4 mg; Prolina 11,5 mg; Glicina 15,3 mg; Alanina 17,4 mg; Cistina 1,26 mg; Lisina 20,7 mg; Histidina 5,6 mg; Arginina 14,1 mg; Metionina 11,1 mg; Triptófano 3,67 mg; Isoleucina 9,8 mg; Leucina 20,1 mg; Fenilalanina 7,7 mg; Tirosina 6,8 mg; Excipientes c.s.p. 1 ml	Bovino Equino Porcino Aves Ovino Caprino Conejos	Administración por vía oral en el agua de bebida. Aves: 0,5 – 1 ml/L agua durante 5 días Bovinos: <i>Jóvenes:</i> 1 ml/L de leche 5 días <i>Adultos:</i> 0,5 – 1 ml/L agua durante 5 días Porcinos: <i>Lechones:</i> 2 ml/L agua 5 días <i>Engorde:</i> 0,5 ml/L agua 5 días	100 ml 1 L 18 L
PARACETAMOL LIQUIDO 30% Solución oral	Paracetamol 300 mg Excipientes csp 1 ml	Porcino Aves	Administración por vía oral en el agua de bebida. 1 ml/10 kg p.v. durante 5 días.	1L 5 L 1 galón
SULFATRIM Solución oral	Sulfametopiridazina 200 mg Trimetoprim 40 mg Excipientes csp 1 ml	Aves Bovino Ovino Caprino	Administración por vía oral en el agua de bebida Ovino, ovino, caprino: 1 ml/L agua, durante 7 días Aves: 0,4-0,8 ml/L agua, durante 3-5 días	1 L 5 L
VETIFOS Solución oral	Zinc (cloruro monohidrato) 4 mg; Cobre (cloruro dihidrato) 3 mg; Manganeso (cloruro tetrahidrato) 2 mg; Calcio (cloruro dihidrato) 23 mg; Magnesio (cloruro hexahidrato) 4,5 mg; Fósforo (fosfato monosódico) 100 mg; Ácido cítrico 204 mg; Excipientes c.s.p. 1 ml	Aves Porcino Bovino Ovino Caprino	Administración oral en el agua de bebida Bovino, Ovino, Caprino y Porcino: 10 a 15 ml/100 kg p.v./ día, durante 5 a 10 días Aves: 5 a 10 ml en 1 L de agua, durante 5 a 10 días.	1 L 5 L

COMPRIMIDOS INTRAUTERINOS				
VEEX-CICLIN 1000 MG Comprimido intrauterino	Clortetraciclina hidrocloruro 1000 mg Excipientes csp 8 g	Bovinos	2 comprimidos por vaca y día, en dosis única	40 × 8 g

BIOCIDAS				
CIPERZURON Concentrado autoemulsionable	Cipermetrina 75 mg Diflubenzurón 45 mg Excipientes csp 1 ml	--	Insectos voladores: 5 ml en 1 L de agua (0.5%). Desinsectación habitual: 10 ml en 1 L de agua (1%). Infestaciones fuertes: 20 ml en 1 L de agua (2%).	1 L 5 L
CLORHEX-VEEX ESPUMANTE Solución	Clorhexidina (digluconato) 20 mg Excipientes csp 1 ml	Porcino	Aplicación directa sobre la piel de los animales diluido al 5-10% en agua en función de la suciedad y heridas.	5 L 25 L
FENOLVEEX POULTRY Concentrado autoemulsionable	p-cloro-m-cresol 250 mg Ácido salicílico 100 mg Excipientes csp 1 ml	--	En caso de desinfección rutinaria aplicar una dilución de 2 L / 100 L de agua durante 30 minutos. Para eliminar oocistes de coccidios aplicar 3-4 L/100 L de agua durante2 horas. En caso de desinfección de virus encapsulados usar 1 L/100 L de agua durante 1 hora.	1 L 5 L
GLUTALVEEX QUATS Solución	Glutaraldehído 150 mg Cloruro de dideclidimetil amonio 100 mg Contiene aceite esencial de Citronela Excipientes csp 1 ml	--	3 ml/L de agua para tratar 10 m². Para el control del virus de la PPA administrar 5 ml/L de agua y aplicar 3 L de solución por cada 10 m².	1 L 5 L
GLUTEX Solución	Glutaraldehído 40 mg Gloxal 32 mg Cloruro de dideclidimetil amonio 100 mg Excipientes csp 1 ml	--	Pulverización-nebulización, aspersión-rociado o lavado a razón de 1 L/200 L de agua.	1 L 5 L 1 galón
YODORVEEX Solución	Yodo 25 mg Excipientes csp 1 ml	--	Suelos, paredes y equipo: 10-50 ml/L de agua. Pulverización manual o automática: 25 ml/m². Pedituvios: 10-50 ml/L de agua.	1 L 5 L



CATÁLOGO GENERAL

PRODUCTOS MEDICINALES VETERINARIOS



REVEEX
MARACAY - ESTADO ARAGUA - VENEZUELA
Av. Antón Phillips, cruce con calle El Canal - Complejo Industrial Reveex - Zona Industrial La Hamaca
Tel. +58-243-551,54,32 /64,03/68,52/69,76 - Fax. +58-243-53,551,68,53 - Página web: <https://reveex.com/laboratorios>

Laboratorios **REVEEX** dispone de catálogos específicos de productos para acuicultura y tripanocidas

NOMBRE COMERCIAL	COMPOSICIÓN	ESPECIES DE DESTINO	VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA	PRES.
MEDICAMENTOS INYECTABLES				
ENDOPARASITICIDAS				
BOVINET Solución inyectable	Ivermectina 31.5 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Ovino Caprino	Vía subcutánea 1 ml/50 kg p.v. dosis única	50 ml 100 ml 250 ml 500 ml
IVERMECTINA 1% Solución inyectable	Ivermectina 10 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Ovino Caprino	Vía subcutánea Bovinos, ovinos: 1 ml/50 kg p.v. dosis única Porcino: 1,5 ml/50 kg p.v. dosis única	10 ml 50 ml 100 ml 500 ml
IVERMECTINA FS Solución inyectable	Ivermectina 10 mg Clorsulón 100 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino	Vía subcutánea Bovinos: 1 ml/50 kg p.v. dosis única	50 ml 100 ml 500 ml
ANTIMICROBIANOS				
DIHIDROESTREX 250 MG/ML Solución inyectable	Dihidroestreptomicina (sulfato) 250 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Porcino	Vía intramuscular 1 ml de medicamento/10 kg p.v./día, durante 3-4 días.	100 ml 250 ml
DOXIVEEX 200 MG/ML Solución inyectable	Doxiciclina (hiclato) 200 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Porcino	Vía intramuscular 0,5 – 1 ml/10 kg p.v. durante 4 a 5 días.	100 ml 250 ml
FENIVEEX Solución inyectable	Florfenicol 300 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Porcino Ovino Caprino	Vía intramuscular 1 ml/15 kg p.v. en 2 dosis con un intervalo de 48 horas.	20 ml 100 ml 250 ml
FLORFENIXIN Solución inyectable	Florfenicol 300 mg Flunixin (meglumine) 16,5 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino	Vía subcutánea (en la tabla del cuello) Administrar 2 ml/15 kg p.v. en dosis única	50 ml 100 ml 250 ml
GENTAVEX 12% Solución inyectable	Gentamicina (sulfato) 120 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Porcino Equino Canino	Vía intramuscular Porcino, bovino y equino: 1 ml/40 kg p.v. cada 12 horas, durante 3 días. Perros: 0,2 ml/8 kg p.v. cada 12 horas, durante 4 a 5 días.	100 ml 250 ml
LINCOSIN-100 Solución inyectable	Lincomicina (hidrocloruro) 100 mg Excipientes csp 1 ml	Porcino	Vía intramuscular Porcino: 1,1 ml/10 kg p.v., de 3 a 7 días.	100 ml 250 ml
LINCOVEEX Solución inyectable	Espectinomicina (sulfato) 100 mg Lincomicina (hidrocloruro) 50 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Porcino	Vía intramuscular 1 ml/kg p.v. y día durante 3 a 5 días	100 ml 250 ml
MARBOFLOXACINA 10% Solución inyectable	Marbofloxacina 100 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Porcino Perros Gatos	Vía subcutánea e intramuscular Bovino: 2 ml/25 kg p.v. en dosis única. Porcino: 1 ml/50 kg p.v. durante 3-5 días.	20 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml
QUINOCOLI 10% Solución inyectable	Enrofloxacin​​a 100 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Porcio	Vía subcutánea e intramuscular Bovino: 7,5 ml/100 kg p.v. al día. Porcino: 0,75 ml/10 kg p.v. al día. En casos graves repetir a las 48 horas	20 ml 100 ml 250 ml
SEPTIBRON FORTE TF Solución inyectable	Florfenicol 150 mg Tilosina (tartrato) 100 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Porcino Ovino Caprino Bufalino	Vía intramuscular profunda. Bovino, ovino, caprino y bufalino: Administrar 1 ml/10 kg p.v. Repetir a las 48 horas Porcino: Administrar 1 ml/30 kg p.v. Repetir a las 48 horas	20 ml 50 ml 100 ml 250 ml
TETRALONG 20 L.A. Solución inyectable	Oxitetraciclina (dihidrato).....200 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Porcino Ovino Caprino	Vía subcutánea e intramuscular profunda Bovinos, Porcinos, Ovinos y Caprinos: 1 ml/10 kg p.v. En casos graves repetir a las 48-72 horas. Lechones: 1 ml/lechón por vía subcutánea.	50 ml 100 ml 250 ml
TETRALONG 30 L.A. Solución inyectable	Oxitetraciclina (dihidrato) 300 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Porcino	Vía subcutánea e intramuscular profunda Bovinos y Porcinos: 1 ml/10 kg p.v., en dosis única. En casos graves repetir a las 48-72 horas.	50 ml 100 ml
TULASOL Solución inyectable	Tulatromicina 100 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Porcino Ovino	Vía subcutánea e intramuscular Bovino: 1 ml/40 kg p.v. en dosis única. Porcino y ovino: 1 ml/40 kg p.v. en dosis única.	50 ml 100 ml
TYLOSINA 200 Solución inyectable	Tilosina (tartrato) 200 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Porcino Ovino Caprino	Vía intramuscular Bovinos adultos: 0,5 a 1 ml/20 kg p.v./día. Terberos, cerdos adultos, ovinos y caprinos: 1 ml/20 kg p.v./día. Lechones: 0,25 ml/5 kg p.v./día. Duración máxima tratamiento: 5 días	100 ml 250 ml
ULTRADIAZINE Solución inyectable	Sulfadiazina 200 mg Trimetoprim 40 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Porcino Ovino Caprino	Vía intramuscular 1 ml/ 10 kg p.v./día, durante 2-3 días. En casos graves repetir a las 12 horas.	100 ml 250 ml

NOMBRE COMERCIAL	COMPOSICIÓN	ESPECIES DE DESTINO	VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA	PRES.
BETALACTÁMICOS				
15-AMOX L.A. Suspensión oleosa inyectable	Amoxicilina (trihidrato) 150 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Porcino Ovino Caprino	Vía intramuscular y subcutánea 1 ml/10 kg p.v., repetir a las 48 horas.	20 ml 50 ml 100 ml
CEPTIFUR Suspensión oleosa inyectable	Ceftiofur (clorhidrato) 50 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Porcino	Vía subcutánea e intramuscular Bovinos: 1 ml/50 kg p.v. de 3 a 5 días. Porcinos: 1 ml/16 kg p.v. durante 3 días.	50 ml 100 ml 250 ml
ENROAMOX Suspensión oleosa inyectable	Amoxicilina (trihidrato) 100 mg Enrofloxacin​​a 50 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Porcino	Vía subcutánea e intramuscular 0,5 - 1 ml/10 kg p.v. de 3 a 5 días.	50 ml 100 ml 250 ml
PENIVEEX-200 RETARD Suspensión inyectable	Bencilpenicilina procaina 100000 IU Bencilpenicilina benzatina 100000 IU Dihidroestreptomicina (sulfato) 200 mg Clorfenamina maleato 1 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Equino Porcino Ovino Caprino	Vía intramuscular o subcutánea Bovino y equino adulto, porcino, ovino y caprino: 5-10 ml/100 kg p.v. Terberos y lechones: 0,75 ml del producto/10 kg p.v. Administrar 2 o 3 inyecciones con intervalo de 48 horas.	100 ml 250 ml
PENIVEEX ESTREPTO 200 Suspensión inyectable	Bencilpenicilina procaina 200 mg Dihidroestreptomicina (sulfato) 200 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Equino Porcino Ovino Caprino	Vía intramuscular o subcutánea Bovino y equino adulto, porcino, ovino y caprino: 5-10 ml/100 kg p.v. Terberos y lechones: 0,75 ml del producto/10 kg p.v. Administrar 2 o 3 inyecciones con intervalo de 48 horas.	100 ml 250 ml
PENIVEEX-300 Suspensión inyectable	Bencilpenicilina procaina 300 mg Excipients q.s. 1 ml	Bovino Porcino Equino Ovino	Vía intramuscular Bovino y equino: 0,4 ml/10 kg p.v. durante 3 días. Ovino y porcino: 0,5 ml/10 kg p.v. durante 3 días.	100 ml 250 ml
VITAMINAS Y MINERALES				
ADEX-3 FORTE Solución hidrodispersable inyectable	Vitamina A 500000 UI Vitamina D3 75000 UI Vitamina E 50 m Excipientes csp 1 ml	Bovino Porcino Ovino Caprino	Vía intramuscular Bovinos adultos: 6 - 8 ml/animal. Terberos y cerdos adultos: 4 ml/animal. Cerdos de engorde, ovinos y caprinos: 2 ml/animal. Lechones, corderos y cabritos: 1 ml/animal. Si es necesario aplicar una nueva dosis al cabo de 30 días.	20 ml 100 ml 250 ml 500 ml
AMINOVEEX INYECTABLE Solución inyectable	Vitamina A 30000 UI Vitamina D3 10000 UI Vitamina E 10 mg Hipofosfito de magnesio 5 mg Sulfato de manganeso 0,7 mg Sulfato de cobre 0,95 mg Cloruro de Magnesio 1 mg Cloruro de Cobalto 0,1 mg L-Arginina 20 mg Acetilmetionina 100 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Porcino Equino Ovino Caprino	Para Equinos y Porcinos vía intramuscular únicamente. Para Bovinos, Ovinos y Caprinos: vía intramuscular o subcutánea Bovinos y Equinos: 2 ml cada 100 Kg p.v. Porcinos, Ovinos y Caprinos: 1 ml cada 15 Kg p.v. Repetir la dosis cada 15 días.	50 ml 100 ml 250 ml
CALCIOVEEX 2:2:1 Solución inyectable	Calcio gluconato 155 mg Calcio hipofosfito 27,5 mg Magnesio cloruro 83,5 mg Glucosa 176 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Equino Ovino Caprino	Vía intravenosa lenta, subcutánea e intramuscular Bovinos y equinos adultos de unos 500 kg de peso: 500 ml. Terberos y potros de 50 a 100 kg de peso: 50 a 100 ml. Ovinos y caprinos: 25 a 50 ml.	250 ml 500 ml
ESVEEX Solución inyectable	Vitamina E 150 mg Selenio (selenito sódico) 0,5 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Porcino Ovino	Vía intramuscular Terberos: 5 ml/animal, repetir a los 7 días Lechones: 0,5 ml/animal, repetir a los 7 días Corderos: 1 ml/animal, repetir a los 7 días	25 ml 50 ml 100 ml
FERTOL Suspensión inyectable	Hierro (III) complejo con Dextrano 182 mg Toltrazurilo 36,5 mg Excipientes idóneos csp 1 ml	Lechones neonatos	Vía intramuscular 0,55 ml/Kg p.v. (equivale a 20 mg/kg de p.v. de toltrazurilo y 100 mg/kg de p.v. de hierro, a dosis única; debe administrarse a los lechones entre 48 y 72 horas después de nacer.	100 ml 250 ml
GLEPTOVEEX Solución inyectable	Hierro (III) complejo gleptoferron 200 mg Excipientes csp 1 ml	Porcino	Vía intramuscular 1 ml/lechón entre el primer y tercer día de vida	100 ml 250 ml
IRONVEEX 200 MG/ML Solución inyectable	Hierro (como Hierro-Dextrano) 200 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Porcino Ovino	Vía intramuscular profunda Lechones: 1 ml/lechón y repetir a los 7 días Terberos: 2,5 ml/ternero y repetir a los 7 días Corderos: 1 ml/cordero y repetir a los 7 días	100 ml
NUTRIL VACAS LECHERAS Solución inyectable	Hipofosfito de calcio 20 mg, Cloruro de cobre 1 mg, Cloruro de cobalto 1 mg, Yoduro potásico 3 mg, Selenito sódico 1,5 mg, Vitamina B12 5 µg, Vitamina D2 1.000 UI, Vitamina A 5.000 UI, Excipiente csp 1 ml	Bovino	Vía intramuscular 1 ml por 30 kg p.v., cada 90 días	250 ml

NOMBRE COMERCIAL	COMPOSICIÓN	ESPECIES DE DESTINO	VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA	PRES.
NUTRIL Solución inyectable	Vitamina A 5.000 UI.; Vitamina D2 20.000 UI.; Vitamina E 5 mg; Vitamina B12 50 µg; Vitamina B6 (clorhidrato) 8 mg; L-Triptófano 0,25 mg; L-Leucina 2,1 mg; L-Lisina clorhidrato 10 mg; L-Valina 2 mg; L-Glicina 5 mg; L-Arginina clorhidrato 4 mg; DL-Metionina 4 mg; L-Histidina clorhidrato 2,1 mg; L-Treonina 0,25 mg; Cobre sulfato 20 µg; Cobalto sulfato 0,13 mg; Zinc gluconato 0,10 mg; hipofosfito de magnesio 2,1 mg; Calcio gluconato 15 mg; cloruro sodio 0,42 mg; Potasio ioduro 0,15 mg; Selenito sódico 1 mg; Hierro citrato (amoniaca) 4 mg; Nandrolona decanonato 2 mg; Excipientes csp 1 ml	Bovino Equino Ovino Caprino	Vía subcutánea e intramuscular Beceros y Potros: 5 ml/animal. Bovinos y Equinos adultos: 10 ml/animal. Corderos y Cabritos: 2 - 3 ml/animal. Ovinos y Caprinos adultos: 5 - 6 ml/animal.	100 ml 250 ml
OSMOLAR VITAMINADO Solución inyectable	Glucosa 50 mg; Calcio cloruro 0,15 mg; Potasio cloruro 0,25 mg; Magnesio hipofosfito 0,20 mg; Sodio acetato 2,5 mg; L-Histidina clorhidrato 20 µg; DL-Metionina 20 µg; L-Triptófano 10 µg; L-Cisteina clorhidrato 10 µg; L-Treonina 35 µg; L-Isoleucina 45 µg; L-Arginina clorhidrato 25 µg; L-Fenilalanina 40 µg; L-Valina 50 µg; L-Lisina clorhidrato 50 µg; L-Leucina 40 µg; Monosodio glutamato 50 µg; Tiamina clorhidrato 0,10 mg; Riboflavina 40 µg; Piridoxina clorhidrato 0,10 mg; Nicotinamida 1,50 mg; D-Pantenol 50 µg, Excipientes csp1 ml	Bovino Equino	Vía intravenosa lenta, subcutánea e intramuscular Terberos y potros: 10 ml/kg p.v./día. Bovinos y equinos adultos: 500 - 2000 ml/animal/día, según peso.	250 ml 500 ml
R-COMPLEX-B Solución inyectable	Vitamina B1 clorhidrato 100 mg, Vitamina B2 fosfato sódico 5 mg, Vitamina B6 clorhidrato 50 mg, Vitamina B12 0,10 mg, Nicotinamida 150 mg, D – Pantenol 5 mg, Excipientes csp 1 ml	Bovino Equino Porcino Ovino Caprino	Vía intramuscular Bovinos y equinos: 1 ml/100 kg p.v./día. Porcinos, ovinos y caprinos: 0,5 ml/50 kg p.v./día. Administrar durante 2 a 3 días, si fuera necesario.	20 ml 100 ml 250 ml
REGULADOR ORGÁNICO REVEFOS Solución inyectable	Vitamina D2 20000 UI; Vitamina E 1 mg; Vitamina B12 50 µg; L-Lisina clorhidrato 10 mg; Arginina aspartato 2 mg; L – Glicina 4,2 mg; DL-Metionina 2,1 mg; Magnesio hipofosfito 2,1 mg; Calcio gluconato 1,5 mg; Sodio cloruro 4,5 mg; Potasio yoduro 0,15 mg; Hipofosfito cálcico 6,25 mg; Excipiente csp 1 ml	Bovino Equino Ovino Caprino	Vía subcutánea e intramuscular Bovinos y equinos adultos: 10 ml/animal. Terberos y potros: 5 ml/animal. Ovinos y caprinos: 5 ml/animal. Corderos y cabritos: 2 a 3 ml/animal.	250 ml 500 ml
ANTIINFLAMATORIOS				
FLUNIVEEX Solución inyectable	Flunixin (meglumine) 50 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Equino Porcino	Vía intramuscular profunda o intravenosa Bovinos: 2 ml/50 kg p.v./día. Equinos: 1 ml/50 kg p.v./día. Porcinos: 2 ml/50 kg p.v./día. Administrar durante un máximo de 5 días.	20 ml 50 ml 100 ml
KETOPROFEN Solución inyectable	Ketoprofeno 100 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Equino Porcino	Vía intramuscular e intravenosa Bovino: 1 ml/33 kg p.v./día de 1 a 3 días Equino: 1 ml/45 kg p.v., de 3 a 5 días Porcino: 1 ml/33 kg p.v./día de 1 a 3 días	100 ml 250 ml
MELOXICAM 4% Solución inyectable	Meloxicam 40 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Porcino	Equinos Vía intramuscular, SC e IV. Bovinos: 2,5 ml/100 kg p.v. por vía SC o IV. Porcinos: 2 ml/100 kg p.v. vía IM. Equinos: 3 ml/100 kg p.v. vía IV.	50 ml 100 ml 250 ml
NOVALGEX Solución inyectable	Dipirona 500 mg Excipientes csp 1 ml	Equino Bovino Ovino Caprino Porcino Canino	Vía intramuscular e intravenosa lenta Equinos adultos: 20 a 60 ml/animal, según peso. Bovinos adultos: 20 a 40 ml/animal. Potros y terberos: 5 a 15 ml/animal. Ovinos y caprinos: 2 a 8 ml/animal. Perros: 10 a 30 ml/animal. Perros: 1 a 5 ml/animal. Repetir varias veces al día (cada 6-8 horas).	20 ml 100 ml
RETARDEX Solución inyectable	Dexametasona (21-fosfato sódico) 0,50 mg Dexametasona (21-isonicotinato) 1 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Equino Porcino Ovino Caprino	Vía intramuscular Bovinos y equinos adultos: 10 ml/animal. Terberos, potros, ovinos y caprinos: 3 a 5 ml/animal. Porcinos: 2 a 5 ml/animal. Lechones, corderos y cabritos: 1 a 2 ml/animal.	10 ml 20 ml 50 ml
TOLFEEX Solución inyectable	Ácido Tolfenámico 40 mg Excipientes csp 1 ml	Bovino Porcino	Bovino: en inflamaciones por enfermedades respiratorias usar 1 ml/ 10 kg de p.v. vía intramuscular en los músculos del cuello. En caso de mastitis, 1 ml/10 kg de p.v. vía IV, dosis única. Porcino: 1 ml/ 20 kg p.v. en inyección intramuscular única.	20 ml 50 ml 100 ml 250 ml