

NOMBRE COMERCIAL	COMPOSICIÓN	ESPECIES DE DESTINO	INDICACIONES	POSOLÓGIA	PRESENTACIÓN
MEDICAMENTOS INYECTABLES					
ANTIMICROBIANOS					
PENIVEEX COMPLEX L.A. Suspensión inyectable	Bencilpenicilina Procaína 150.000 UI Bencilpenicilina Benzatina 50.000 UI Dihidroestreptomicina (sulfato) 200 mg Clorfenamina maleato 10 mg Excipientes c.s.p. 1 ml	Caninos Felinos	Perros y gatos: Neumonía, Amigdalitis, Traqueobronquitis, Metritis, Infecciones genitourinarias, Heridas infectadas, Tétanos, Enteritis bacterianas. Enterotoxemia, Carbón bacteriano, Metritis, Heridas infectadas, Abscesos.	Perros: Vía intramuscular o subcutánea. Perros grandes: 0,5 a 1 ml/10 kg p.v. Perros medianos: 1 ml/perro Perros pequeños: 0,5 ml/perro. Gatos: 0,5 ml/gato.	10 ml
QUINOCOLI Solución inyectable	Enrofloxacin 50 mg Excipientes c.s.p. 1 ml	Caninos Felinos	Perros y gatos: Infecciones respiratorias, Infecciones gastrointestinales, Infecciones urinarias y genitales, Infecciones cutáneas, Infecciones del conducto auditivo externo (otitis externa), Infecciones secundarias de enfermedades virales (Moquillo canino, Parvovirus, Rinotraqueitis felina).	Vía subcutánea Perros y gatos: 5 mg Enrofloxacin/kg p.v. (equivalente a 0,1 ml/kg p.v.) por día durante 5 días consecutivos. En caso de infecciones severas y/o crónicas (Piodermitis) e Infecciones urinarias crónicas o recidivantes, se puede prolongar el tratamiento hasta 10 días.	10 ml 20 ml 50 ml
SEDACIÓN					
SEDANXIL Solución inyectable	Xilacina (clorhidrato) 20 mg (equivalente a 23,3 mg de Xilacina clorhidrato) Excipiente c.s.p. 1 mL	Caninos Felinos	Perros y gatos: Tranquilizante, sedante, analgésico, Relajante muscular, Pre-anestésico	Vía intramuscular. Perros: 1-3 mg Xilacina/kg p.v. (equivalente a 0,05 -0,15 ml/kg p.v.) Gatos: 3 mg Xilacina/kg p.v. (equivalente a 0,15 ml/kg p.v.)	10 ml
ANTIHEMÉTICOS					
CLOPRAMID Solución inyectable	Metoclopramida clorhidrato 5 mg Excipientes c.s.p. 1 ml	Caninos Felinos	Tratamiento sintomático de náuseas y vómitos, principalmente en casos de: gastritis, dispepsia, espasmo de píloro, nefritis crónica e intolerancia digestiva a ciertos medicamentos. Preparación para exploraciones del tubo digestivo.	Vía intravenosa lenta, intramuscular o subcutánea Perros y gatos: 0,5 mg Metoclopramida/kg p.v. (equivalentes a 0,5 ml/5 kg p.v.) Las inyecciones pueden repetirse a intervalos de 6-8 horas.	10 ml
HORMONALES					
ESTROVET Suspensión inyectable	Medroxiprogesterona (acetato) 25 mg Excipiente c.s.p. 1 ml	Caninos Felinos	Perras y gatas: Inhibición del celo, con objeto de evitar apareamientos y fecundaciones indeseables. Tratamiento curativo de la metrorragia Tratamiento curativo de la ninfomanía en gatas.	Vía subcutánea Perras y gatas: Inhibición del celo: Perras hasta 10 kg de peso: 2 ml Perras de 10 a 20 kg de peso: 4 ml Perras de mas de 20 kg de peso: 6 ml	5 ml

ANTIPARASITARIOS INTERNOS					
IVERMECTINA 1% Solución inyectable	Ivermectina 10 mg Excipientes c.s.p. 1 ml	Caninos	Perros Tratamiento y control de Nematodosis por Ascáridos (<i>Toxocara canis</i> , <i>Toxascaris leonina</i>) y Ancylostomas (<i>Ancystoma caninum</i> , <i>Uncinaria stenocephala</i>). Prevención de la Dirofilariosis cardiopulmonar canina (enfermedad del gusano del corazón), eliminando el estado larvario tisular de <i>Dirofilaria immitis</i> . Tratamiento y control de la sarna de las orejas (<i>Otodectes cynotis</i>) e infestaciones por piojos.	Vía subcutánea Perros: 200 – 400 µg Ivermectina/kg p.v. (equivalentes a 0,1 – 0,2 ml/5 kg p.v.) una vez al mes, en el mismo o cerca del mismo día de cada mes.	5 ml 10 ml
FORMAS FARMACÉUTICAS ORALES					
POLVOS PARA ADMINISTRACIÓN ORAL					
OSMOLAR ORAL Polvo hidrosoluble oral	Glucosa 800 mg; Sodio 1,70 mEq; Calcio 0,19 mEq; Inositol 20 mg; Lisina 10 mg; Cloruros 1,98 mEq; Potasio 0,10 mEq; Ac. Láctico 0,20 mEq; Arginina aspartato 20 mg; Excipiente c.s.p 1 g	Caninos Felinos	Perros y gatos: Deshidratación por diarreas de origen bacteriano, viral o nutricional. Deshidratación de origen infeccioso (hipertermia) o parasitario. Deshidratación por vómitos. Estados de shock. Stress.	Vía oral Perros y gatos: Disolver el contenido de un sobre (20 g) por litro de agua de bebida y día durante 7 días. La duración del tratamiento tiene que adaptarse a cada caso en particular y teniendo en cuenta los problemas observados. Pueda administrarse de forma simultánea con antibióticos o quimioterápicos.	Estuche de cartón con 25 sobres de 20 g
SOLUCIONES Y SUSPENSIONES PARA ADMINISTRACIÓN ORAL					
ALBENDEX 10% Suspensión oral	Albendazol 100 mg Excipientes c.s.p. 1 ml	Caninos Felinos	Perros y Gatos. Tratamiento de Nematodosis gastrointestinales y pulmonares, producidas por nematodos sensibles al Albendazol, tanto formas adultas como larvas y huevos. Tratamiento y control de Nematodosis (<i>Toxocara canis</i> , <i>T. cati</i> , <i>Toxascaris leonina</i>), Tricocefalos (<i>Trichuris vulpis</i>) y Ancylostomas (<i>Ancylostoma caninum</i> , <i>A. tubaeforme</i> , <i>Uncinaria stenocephala</i>). Tratamiento y control de Teniosis por <i>Tenia pisiformis</i> , <i>Tenia hydatigena</i> , <i>Hydátigera taeniaeformis</i> y <i>Echinococcus granulosus</i> .	Vía oral Perros y gatos: <u>Tratamiento de Nematodosis:</u> 1ml/10 kg p.v. (equivalente a 10 mg de ALBENDEX 10%/kg p.v., dos veces al día (mañana y noche). Tratar 3 días seguidos. En Nematodosis: tratar 3 días consecutivos <u>Tratamiento de Teniasis:</u> 1ml/10 kg p.v. (10 mg de ALBENDEX 10%/ p.v., dos veces al día (mañana y noche). Tratar 5 días seguidos. Se recomienda repetir el tratamiento a los 21 días.	50 ml
ANTIDIARREX Suspensión oral	Attapulgita 70 mg; Neomicina (sulfato) 5 mg; Sulfaguanidina (sódica) 12 mg; Tetraciclina (clorhidrato) 2 mg; Tilosina (tarttrato) 2 mg; Vitamina B ₁ 1,5 mg; Vitamina B ₂ 1,5 mg; Vitamina B ₆ 1,5 mg; Vitamina C 5 mg; Vitamina A 2.000 UI; Excipiente c.s.p 1 ml	Caninos Felinos	Perros y gatos: Tratamiento de enteritis bacterianas, enteritis de origen tóxico o alimentario, diarreas hemorrágicas asociadas con la leptospirosis, diarreas por moquillo, diarreas asociadas a infestaciones parasitarias.	Vía oral Perros y gatos: Agitar el envase y administrar por vía oral directa. 1 ml/Kg. p.v. cada 12 horas, durante 3 a 5 días consecutivos. En casos graves, administrar el doble de la dosis indicada, por lo menos el primer día de tratamiento.	50 ml

DERMOFER Solución oral	Vitamina A 1.700 UI; Vitamina D3 170 UI; Vitamina E acetato 0,1 mg; Inositol 1,4 µg; Colina 2 µg; Ácido linoleico 4,345 mg; Ácido linolénico 0,63 mg; Otros ácidos grasos insaturados 2,816 mg; Excipientes c.s.p. 1 ml	Caninos Felinos	Perros y gatos: Piel seca, Dermatitis y Seborrea. DERMOFER está indicado en el tratamiento preventivo y curativo de afecciones de la piel y del pelo producidas por dietas insuficientes en ácidos grasos insaturados, principalmente ácido linoleico y ácido linolénico.	Vía oral Perros y gatos: Administrar diariamente, directamente o mezclado con el alimento. Perros y gatos de 1 a 8 kg: ½ cucharada (2,5 ml) Perros de 8 a 15 kg: 1 cucharada (5 ml) Perros de 15 a 30 kg: 1½ cucharadas (7,5 ml) Perros demás de 30 kg: 2 cucharadas (10 ml) En perros y gatos con el pelo muy seco se recomienda doblar la dosis indicada. Esta pauta de tratamiento debe seguirse durante 6 a 8 semanas o en función del criterio del Médico Veterinario.	50 ml 100 ml
DOXIVEEX ORAL Suspensión inyectable	Doxiciclina (hclato) 100 mg Excipientes c.s.p. 1 ml	Caninos Felinos	Perros: Tratamiento de Ehrlichiosis canina (Pancitopenia tropical canina) causada por <i>Ehrlichia canis</i> y/o <i>Anaplasma platys</i> (<i>Ehrlichia platys</i>). Perros y gatos: Tratamiento de infecciones respiratorias, Amigdalitis, Neumonía, Dermatitis, Abscesos, Infecciones genitourinarias, Metritis.	Vía oral Perros y gatos: Administrar directamente 1 ml/10 kg p.v. (equivalente a 10 mg de Doxiciclina/kg p.v.), cada 12 horas, durante 15 a 21 días consecutivos	30 ml
HIDRO-REX VITAL AMINOÁCIDOS Solución oral	Vitamina A 20.000 UI; Vitamina D3 5.000 UI; Vitamina E 9 mg; Vitamina B1 5 mg; Vitamina B2 10 mg; Vitamina B6 30 mg; Vitamina B12 30 µg; Vitamina C 50 mg; Vitamina K3 5 mg; Ácido fólico 1 mg; Ácido nicotínico 20 mg; Pantotenato de Calcio 10 mg; Ácido aspártico 14,5 mg; Treonina 6,4 mg; Serina 6,6 mg; Ácido glutámico 26,4 mg; Prolina 11,5 mg; Glicina 15,3 mg; Alanina 17,4 mg; Cistina 1,26 mg; Metionina 11,1 mg; Isoleucina 9,8 mg; Leucina 20,1 mg; Fenilalanina 7,7 mg; Tirosina 6,8 mg; Lisina 20,7 mg; Histidina 5,6 mg; Arginina 14,1 mg; Triptófano 3,67 mg; Excipientes c.s.p 1 ml	Caninos Felinos	Perros y Gatos: Avitaminosis en general, Convalecencia de enfermedades infecciosas o parasitarias, Falta de apetito, Estados de gestación y lactación. Activador del crecimiento	Vía oral Perros: 5 a 10 ml/perro/día, según peso, durante 10 a 12 días. Gatos: 3 a 5 ml/ gato/día, según peso durante 10 a 12 días.	30 ml
COMPRIMIDOS					
BRONCOVEEX Comprimidos masticables	Bromhexina (clorhidrato) 10 mg Excipientes c.s.p 200 mg	Caninos Felinos	Perros y gatos: Mucolítico-expectorante En infecciones y afecciones de las vías respiratorias que cursan con un incremento de la producción anormal de moco y/o de su viscosidad, en particular, bronquitis, bronconeumonía, traqueítis, neumonía, laringitis y rinitis; para facilitar la expectoración y calmar la tos. En infecciones respiratorias administrar junto con antibióticos y/o quimioterápicos.	Vía oral Perros y gatos: Administrar directamente o desmenuzados con una pequeña cantidad de alimento. Cachorros, perros pequeños y gatos: ¼ tableta/5 kg p.v. y día Perros medianos: ½ tableta/10 kg p.v. y día Perros grandes: 1 tableta/20 kg p.v. y día Administrar durante 5 días consecutivos.	Estuche con 2 blísteres con 6 comprimidos

DOXIVEEX TABLETA Comprimidos masticables	Doxiciclina (hiclato) 100 mg Excipientes c.s.p. 500 mg	Caninos Felinos	Perros: Tratamiento de la Ehrlichiosis canina (Pancitopenia tropical canina) causada por <i>Ehrlichia canis</i> . Tratamiento de infecciones respiratorias, amigdalitis, neumonías, dermatitis, abscesos, infecciones genitourinarias, metritis.	Vía oral Se recomienda administrar los comprimidos junto con las comidas. Ehrlichiosis canina 1 comprimido /10 kg p.v. (10 mg de Doxiciclina/kg p.v.), cada 12 horas durante 15 a 21 días. Otros tratamientos 1 comprimido/10 kg p.v.) 10 mg de doxiciclina/kg p.v. /día, durante 3 a 5 días, en los casos agudos; y durante 8 a 10 días, en casos crónicos.	Estuche con 2 blíster de 7 comprimidos
FLURALVEX Comprimido masticable	Fluralaner 112,5 mg Excipientes c.s.p. 300 mg	Caninos	Perros: Para el control de infestaciones por garrapatas y pulgas en perros con actividad inmediata y de larga duración durante 12 semanas. Proporciona una actividad para matar garrapatas (<i>Ixodes ricinus</i> , <i>Ixodes hexagonus</i> , <i>Ixodes scapularis</i> , <i>Ixodes holocyclus</i> , <i>Dermacentor reticulatus</i> , <i>Dermacentor variabilis</i> y <i>Rhipicephalus sanguineus</i> (adultas y juveniles) y pulgas (<i>Ctenocephalides felis</i> y <i>Ctenocephalides canis</i>). FLURALVEX provee protección contra infecciones por <i>Babesia canis</i> transmitida por garrapatas del género <i>Dermacentor reticulatus</i> debido a la muerte de las garrapatas antes de que la transmisión de la enfermedad ocurra. Esta protección se ha demostrado por un periodo de 12 semanas posteriores al tratamiento. Para el tratamiento de la demodicosis causada por <i>Demodex spp.</i> , sarna sarcóptica e infestaciones por ácaros Otodectes spp. en perros.	Vía oral Perros: FLURALVEX debe administrarse de acuerdo con la siguiente dosis: de 25-56 mg de Fluralaner/kg de peso dentro de una franja de peso. Los comprimidos masticables no deben romperse o dividirse. Para perros con un peso superior a 56 kg, utilizar una combinación de dos comprimidos que se ajuste lo máximo posible a su peso. <u>Método de administración</u> Administrar FLURALVEX comprimidos masticables a la hora o cerca de la hora de comer. FLURALVEX es un comprimido masticable y es bien aceptado por la mayoría de los perros. Si el perro no acepta el comprimido voluntariamente, también puede administrarse con la comida o directamente en la boca. Debe observarse al perro durante la administración para asegurarse de que se traga el comprimido.	Estuche con 1 blíster con 1 comprimido
NEUMOVEEX COMPRIMIDOS Comprimido masticable	Sulfadiacina sódica 200 mg Trimetoprim 40 mg Bromhexina clorhidrato 10 mg Excipiente c.s.p. 500 mg	Caninos Felinos	Perros y gatos: Tratamiento de infecciones respiratorias, infecciones génito-urinarias, complicaciones bacterianas de enfermedades virales (moquillo canino).	Vía oral Perros adultos: 1 comprimido/10 kg p.v./cada 12 horas Cachorros y gatitos: ½ comprimido/5 kg p. v/cada 12 horas Administrar durante 4 a 5 días	Estuche con 2 blísteres de 5 comprimidos
MEDICAMENTOS OFTÁLMICOS					
COLIRIO ANTIBIÓTICO Solución oftálmica	Cloranfenicol 5 mg Excipiente c.s.p. 1 ml	Caninos Felinos	Perros y gatos: Infecciones oculares y/o de zonas contiguas, producidas por gérmenes sensibles al Cloranfenicol.	Vía oftálmica Aplicar 2 gotas en el ojo afectado cada 3 horas o más frecuentemente durante las primeras 48 horas, pudiéndose aumentar posteriormente el intervalo entre aplicaciones.	5 ml 10 ml 15 ml 30 ml
MEDICAMENTOS ÓTICOS					

ODINEX Solución ótica	Neomicina (sulfato)	7,2 mg	Caninos Felinos	Perros y gatos: Tratamiento tópico de otitis externas: eccematosas, infecciosas, parasitarias (sarna).	Vía ótica Instilar 5-10 gotas en el conducto ótico dos veces al día, durante 7 –10 días. Efectuar un ligero masaje en la base de la oreja a fin de que el producto penetre bien en el oído y contacte con las paredes lesionadas.	15 ml
	Fipronilo	0,05 mg				
	Dexametasona	1 mg				
	Lidocaína clorhidrato	5 mg				
	Excipientes c.s.p	1 ml				
CHAMPÚS						
CHAMPÚS MEDICINALES						
CHAMPÚ ANTICASPA Champú	Bioazufre fluido	20 mg	Caninos Felinos	Perros y gatos: Indicado para el cuidado de la piel y el pelaje con tendencia a la seborrea. Su composición es óptima para la limpieza de la piel y el pelaje, mejorando el estado del pelo, evitando la exfoliación excesiva de la epidermis. Regulan la actividad de las glándulas sebáceas, aliviando la irritación.	Vía tópica Mojar el pelo con agua tibia y aplicar CHAMPÚ ANTICASPA. Frotar suavemente y aclarar. Repetir y dejar actuar durante 10-15 minutos. Aclarar con agua limpia abundante. Usar semanalmente o según consejo veterinario.	200 ml 400 ml 1 galón
	Excipientes y tensioactivos c.s.p.	1 ml				
CHAMPÚ ANTIMICÓTICO K Champú	Ketoconazol	20 mg	Caninos Felinos	Perros y gatos: Tratamiento de dermatitis seborreica en la que están involucrados hongos de los géneros <i>Microsporum</i> , <i>Trichophyton</i> y <i>Epidermophyton</i> , <i>Candida</i> , <i>Sporofhrix</i> , <i>Coccidioides</i> , <i>Aspergillus</i> y <i>Malassezia</i> .	Vía tópica Humedecer por completo el pelaje, aplicar el CHAMPÚ ANTIMICÓTICO K de forma generosa, frotar y masajear principalmente el área afectada. Dejar actuar el principio activo durante 10 a 15 minutos antes de enjuagar con abundante agua. Repetir si es necesario. Repetir si es necesario. El tratamiento varía de acuerdo con el cuadro clínico de cada animal y a recomendaciones del médico veterinario.	200 ml 400 ml 1 galón
	Excipientes y tensioactivos c.s.p.	1 ml				
CHAMPÚ DERMATOLÓGICO Champú	Clorhexidina digluconato	20 mg	Caninos Felinos	Perros y gatos: Tratamiento tópico de la pioderma causada por <i>Staphylococcus intermedius</i> , complementario de la oportuna terapia sistémica.	Vía tópica: Aplicar e CHAMPÚ DERMATOLÓGICO sobre el pelo húmedo del animal, frotando hasta conseguir espuma. Se realizará una primera aplicación y se enjuagará con abundante agua, tras los cuales se enjuagará con abundante agua. La frecuencia de aplicación será de 2 baños semanales durante 4 semanas. Posteriormente se realizará una segunda aplicación y se dejará actuar el pelo de animal durante 10 minutos	200 ml 400 ml 1 galón
	Excipientes y tensioactivos c.s.p.	1 ml				
CHAMPÚ ANTIALÉRGICO Champú	Polidocanol	20 mg	Caninos Felinos	Perros y gatos: Champú hipoalergénico para la higiene periódica especialmente formulado para perros y gatos con reacciones alérgicas y que se rascan a menudo debido a irritaciones de la piel como eczemas o sarpullidos. De agradable olor, fortalece las raíces del pelo y le proporciona suavidad y un brillo sedoso. Limpia suavemente el pelo y la piel.	Vía tópica. Administrar mediante lavado. Mojar totalmente el pelo del animal con agua tibia y aplicar pequeñas cantidades del champú frotando hasta obtener abundante espuma y repartirla uniformemente por todo el animal. Dejar que actuar durante 10 a 15 min y aclarar con abundante agua. Repetir en caso necesario y secar bien.	200 ml 400 ml 1 galón
	Excipientes y tensioactivos c.s.p.	1 ml				

CHAMPÚ ANTIPULGAS REVEEX Champú	Permetrina2 mg Butóxido Piperonilo10 mg Excipientes y tensioactivos c.s.p.1 ml	Caninos	Perros: Indicado para el control de parasitosis externas: garrapatas tipo <i>Ripicephalus sanguineus</i>, ácaros de la sarna, piojos y pulgas en perros.	Vía tópica: Mojar el pelo del animal completamente y aplicar pequeñas cantidades de CHAMPÚ ANTIPULGAS. Frotar hasta obtener abundante espuma. Dejar reposar 5 minutos. Enjuagar con abundante agua y secar el animal. Repetir semanalmente para mantener al animal libre de parásitos externos.	200 ml 400 ml 1 galón																																
CHAMPÚ ANTIPARASITARIO REVEEX Champú	Fipronilo25 mg Extracto Aloe vera20 mg Excipientes y tensioactivos c.s.p.1 ml	Caninos Felinos	Perros y gatos: Champú para la higiene periódica de los animales de compañía. Actúa eficazmente contra pulgas, piojos y garrapatas. Cuida y embellece el pelo del animal.	Vía tópica Mojar totalmente el pelo del animal con agua tibia. Aplicar pequeñas cantidades de Champú y agua. Frotar para obtener abundante espuma y repartirla uniformemente por todo el animal. Dejar actuar durante 5 minutos. Aclarar con abundante agua y secar bien al animal. Repetir la aplicación semanalmente.	200 ml 400 ml 1 galón																																
CHAMPÚS HIGIÉNICOS																																					
CHAMPU ALOE PETS REVEEX Champú	Aloe Barbadenses (Milicápsulas)0,6 mg Excipientes y tensioactivos c.s.p.1 ml	Caninos Felinos	Perros y gatos: Champú antialérgico para la higiene periódica especialmente formulado para favorecer en perros y gatos la cicatrización de todo tipo de heridas y con problemas de piel seca. De agradable olor, protege la piel contra la pérdida de humedad, dejándola fuerte y flexible. Limpia suavemente el pelo y la piel.	Vía tópica Administrar mediante lavado. Mojar totalmente el pelo del animal con agua tibia y aplicar pequeñas cantidades del champú frotando hasta obtener abundante espuma y repartiéndola uniformemente por todo el animal. Dejar que actúe durante 2 a 3 min. y aclarar con abundante agua. Repetir en caso necesario, secar bien.	250 ml																																
CHAMPÚ VITAMINADO REVEEX CON MILICÁPSULAS Champú	Vitamina A, E y Pantenol (Milicápsulas) (corresponde a 1700 U.I. de Vitamina A, 1 UI de Vitamina E, y 0,002 g de Pantenol)1 g Excipientes y tensioactivos c.s.p.100 ml	Caninos Felinos	Perros y gatos: Champú con vitaminas para la higiene periódica, de agradable olor que fortalece la estructura del pelo seco y poroso y proporciona al pelo suavidad y un brillo sedoso. Da fuerza y tersura a la piel.	Vía tópica Administrar mediante lavado. Mojar totalmente el pelo del animal con agua tibia y aplicar pequeñas cantidades del champú frotando hasta obtener abundante espuma y repartiéndola uniformemente por todo el animal. Dejar que actúe durante 2 a 3 min. y aclarar con abundante agua. Enjuagar con abundante agua y secar.	250 ml																																
ANTIPARASITARIOS EXTERNOS																																					
FORTAREEX MULTI POR CATS Pipetas	Imidacloprid91 mg Piriproxifeno4,6 mg Excipientes c.s.p.1 ml	Felinos	Gatos: FORTAREEX MULTI FOR CATS está indicado para la prevención y tratamiento de infestaciones por pulgas y piojos en gatos.	Vía tópica<table><tr><th>Peso gatos</th><th>Volumen por dosis</th><th>Imidacloprid</th><th>Piriproxifeno</th></tr><tr><td>1,0-2,25 kg</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gatitos recién nacidos</td><td>0,25 ml</td><td>22,75</td><td>1,15</td></tr><tr><td>8 semanas o mas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2,25-4,0 kg</td><td>0,4 ml</td><td>36,4</td><td>1,84</td></tr><tr><td>8 semanas o más</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Más de 4,0 kg</td><td>0,8 ml</td><td>72,8</td><td>3,68</td></tr><tr><td>8 semanas o mas</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Peso gatos	Volumen por dosis	Imidacloprid	Piriproxifeno	1,0-2,25 kg				Gatitos recién nacidos	0,25 ml	22,75	1,15	8 semanas o mas				2,25-4,0 kg	0,4 ml	36,4	1,84	8 semanas o más				Más de 4,0 kg	0,8 ml	72,8	3,68	8 semanas o mas				0,25 ml 0,4 ml 0,8 ml
Peso gatos	Volumen por dosis	Imidacloprid	Piriproxifeno																																		
1,0-2,25 kg																																					
Gatitos recién nacidos	0,25 ml	22,75	1,15																																		
8 semanas o mas																																					
2,25-4,0 kg	0,4 ml	36,4	1,84																																		
8 semanas o más																																					
Más de 4,0 kg	0,8 ml	72,8	3,68																																		
8 semanas o mas																																					

FORTAREEX MULTI FOR DOGS Pipetas	Imidacloprid88 mg Permetrina440 mg Piriproxifeno4,4 mg Excipientes c.s.p.1 g	Caninos	Perros: FORTAREEX MULTI FOR DOGS está indicado para la prevención y tratamiento de infestaciones por los siguientes ectoparásitos en perros: - Pulgas (Ctenocephalides felis, C. canis): La actividad adulticida comienza en 12 horas. También previene las infestaciones por pulgas hasta 4 semanas. - Garrapatas (Ixodes spp., Rhipicephalus spp., Dermacentor spp.): Repele y mata las garrapatas antes de que puedan adherirse y alimentarse. - Mosquitos (Aedes spp., Culex spp.): Repele y reduce la alimentación, minimizando así el riesgo de transmisión de enfermedades transmitidas por vectores como la Dirofilaria immitis. - Moscas picadoras (por ejemplo, Stomoxys calcitrans): Repele y mata. - Tábanos (Phlebotomus spp.): Repele y ayuda a prevenir la transmisión de Leishmania.	Vía tópica <table><tr><th>Cinta de peso para perros</th><th>Volumen por dosis</th><th>Imidacloprid</th><th>Permetrina</th><th>Piriproxifeno</th></tr><tr><td>1,8-4,5 kg (4-10 lbs)</td><td>0,4 ml</td><td>40</td><td>200</td><td>2</td></tr><tr><td>4,6-9,1 kg (11-20 lbs)</td><td>1,0 ml</td><td>100</td><td>500</td><td>5</td></tr><tr><td>9,2-25 kg (21-55 lbs)</td><td>2,5 ml</td><td>250</td><td>1250</td><td>12,5</td></tr><tr><td>>55 libras (25,1-50+ kg)</td><td>4,0 ml</td><td>400</td><td>2000</td><td>20</td></tr><tr><td>>110 lbs (50+ kg)</td><td>Utilizar dos pipetas de 4,0 ml.</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Cinta de peso para perros	Volumen por dosis	Imidacloprid	Permetrina	Piriproxifeno	1,8-4,5 kg (4-10 lbs)	0,4 ml	40	200	2	4,6-9,1 kg (11-20 lbs)	1,0 ml	100	500	5	9,2-25 kg (21-55 lbs)	2,5 ml	250	1250	12,5	>55 libras (25,1-50+ kg)	4,0 ml	400	2000	20	>110 lbs (50+ kg)	Utilizar dos pipetas de 4,0 ml.				0,4 ml 1,0 ml 2,5 ml 4,0 ml
Cinta de peso para perros	Volumen por dosis	Imidacloprid	Permetrina	Piriproxifeno																															
1,8-4,5 kg (4-10 lbs)	0,4 ml	40	200	2																															
4,6-9,1 kg (11-20 lbs)	1,0 ml	100	500	5																															
9,2-25 kg (21-55 lbs)	2,5 ml	250	1250	12,5																															
>55 libras (25,1-50+ kg)	4,0 ml	400	2000	20																															
>110 lbs (50+ kg)	Utilizar dos pipetas de 4,0 ml.																																		
SARNIVEEX 12,5% Concentrado emulsionable para baños	Amitraz125 mg Excipientes c.s.p.1 ml	Caninos	Perros: Tratamiento y control de la Sarna demodéctica y Sarna sarcóptica. Tratamiento y control de infestaciones por garrapatas.	Vía tópica Infestaciones por garrapatas y Sarna demodéctica: diluir 5 ml en 3,5 L de agua y aplicar. Repetir el tratamiento cada 10 días por 3 a 4 veces. Sarna sarcóptica: diluir 5 ml en 5 L de agua y repetir tratamiento a los 7 días	50 ml 100 ml																														