

# FENIVEEX

FLORFENICOL

## Feniveex inyectable

Solución inyectable de Florfenicol 30%



### ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

#### Bovinos, ovinos y caprinos:

Tratamiento curativo de infecciones del tracto respiratorio causadas por *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida* y *Haemophilus somnus*.

Tratamiento curativo de la Pododermatitis infecciosa bovina causada por *Fusobacterium necrophorum* y *Bacteroides melaninogenicus*.

#### Porcinos:

Tratamiento curativo del complejo neumónico causado por *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica* y *Haemophilus spp.*

### ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Administrar por vía intramuscular, en la musculatura del cuello.

#### Bovinos, porcinos, ovinos y caprinos:

1 ml por 15 kg de peso vivo (equivalente a 20 mg de Florfenicol por kg de peso vivo).

El tratamiento consiste en la administración de 2 dosis con un intervalo de 48 horas.

### PRESENTACIÓN

Frasco con 100 ml

### VENTAJAS CON FENIVEEX INYECTABLE

Elevadas concentraciones antibióticas.

Actividad antibacteriana sostenida.

Es suficiente sólo 2 inyecciones.

Elevada tasa de curación clínica.

Se simplifica el manejo.

Se reduce el estrés en los animales.

Se reduce el porcentaje de recaídas.

Amplio margen de seguridad.

## Feniveex inyectable

Florfenicol 30% injectable solution



### TARGET SPECIES AND INDICATIONS

#### Cattle, sheep, and goats:

Curative treatment of infections in the respiratory tract caused by *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida* and *Haemophilus somnus*.

Curative treatment of bovine infectious pododermatitis caused by *Fusobacterium necrophorum* and *Bacteroides melaninogenicus*.

#### Pigs:

Curative treatment of pneumonic complex caused by *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica* and *Haemophilus spp.*

### ADMINISTRATION AND DOSAGE

Administer by intramuscular route, in neck's muscle.

#### Cattle, sheep, goats and pigs:

1 ml./15 kg. b.w. (equivalent to 20 mg Florfenicol/kg b. w.).

The treatment consists in administering 2 doses at a 48-h interval.

### PRESENTATION

100-ml vial

### FENIVEEX INYECTABLE ADVANTAGES

High antibiotic concentrations

Persistent antibacterial activity

2 injections are enough

High rate of clinical healing

Easier handling

Reduced stress in animals

Reduced percentage of relapses

Wide range of safety

## Feniveex oral

Solución oral de Florfenicol 10%



### ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Pollos de engorde, pollitas de reemplazo y reproductoras:**

Tratamiento curativo de infecciones entéricas y respiratorias causadas por *E. coli* y otras bacterias sensibles al Florfenicol. En particular:

- Enteritis colibacilar
- Colibacilosis respiratoria
- Colisepticemia
- Complicaciones con *E. coli* de enfermedades infecciosas (Coriza, C.R.D.)

### ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Administrar por vía oral, en agua de bebida.

**Pollos de engorde, pollitas de reemplazo y reproductoras:**

1 ml de FENIVEEX ORAL por litro de agua de bebida y día (equivalente a 20 mg de Florfenicol por kg de peso vivo y día), durante un periodo de 3 a 5 días consecutivos, en función de la gravedad del caso individual a tratar.

Esta dosis en ml/litro de agua está basada en la dosis por kg de peso vivo y en el consumo promedio de agua y por tanto puede ser modificada según el consumo, bajo las condiciones existentes en la zona.

### PRESENTACIÓN

Envase con 1 litro

1 galón (3,785 litros)

### VENTAJAS CON FENIVEEX ORAL

- Excelente absorción a nivel intestinal
- Elevadas concentraciones antibióticas
- Concentraciones plasmáticas muy similares a las obtenidas por vía parenteral
- Tiempo de espera muy corto: 5 días
- Amplio margen de seguridad

## Feniveex oral

Florfenicol 10% oral solution



### TARGET SPECIES AND INDICATIONS

**Fattening chickens, replacement pullets and breeders:**

Curative treatment of enteric and respiratory infections caused by *E. coli* and other Florfenicol-sensitive bacteria. Particularly:

- Colibacillary enteritis.
- Respiratory colibacillosis.
- Colisepticaemia.
- Complications by *E. coli* of infectious diseases (Coryza, C. R. D.).

### ADMINISTRATION AND DOSAGE

Administer orally in the drinking water.

**Fattening chickens, replacement pullets and breeders:**

1 ml of FENIVEEX ORAL per liter of drinking water and day (equivalent to 20 mg Florfenicol/kg b. w./day), for 3 to 5 consecutive days, depending on the severity of each particular case.

This dose in ml/liter of water is founded on the dose per kg of body weight and the average consumption of water, so it can be modified according to the consumption reported in each area.

### PRESENTATION

1-liter container

1-gallon (3.785 liters) container

### FENIVEEX ORAL ADVANTAGES

- Excellent intestinal absorption
- High antibiotic concentrations
- Plasma concentrations very similar to those obtained by parenteral route
- Very short withdrawal time: 5 days
- Wide margin of safety