

TRYPANOSOMOSIS

Enfermedad hemoparasitaria causada por *Trypanosoma vivax*, el cual se transmite mediante la picadura por insectos hematófagos (tabanuss spp) mosca brava, etc., que portan e inoculan el tripanosoma pasando de animales infectados a animales sanos. Esta enfermedad se manifiesta en formas aguda y crónica.

Los signos clínicos en la forma aguda son:

- Fiebre alta.
- Perdida de apetito.
- Disminución súbita de la producción de leche.
- Anemia aguda.
- Decaimiento y muerte.

Los signos clínicos en la forma crónica son:

- Fiebre de peso.
- Abdomen retraído.
- Arcos costales muy marcados.
- Ojos hundidos.
- Anemia progresiva.
- Abortos.

ANTHELMINTICO - ECTOPARASITICIDA

Inicio de lluvias:

Aumentan las condiciones para las parasitosis.

Inicio de sequía:

La idea es limpiar al ganado de parásitos que vienen del invierno y así poder sobrellevar lo duro de las condiciones del verano.

Enfermedades hemoparasitarias y antihelmínticos que producen un impacto económico negativo en la ganadería nacional:

- Menor producción de carne.
- Menor producción de leche.
- Trastornos reproductivos (disminuye el número de partos).
- Aumento de la mortalidad.

HEMOVEEX S.O.

El único antiparasitario con la novedosa presentación en forma de suspensión oleosa inyectable, que confiere mayor estabilidad y combina de manera eficaz el efecto farmacológico de la Ivermectina y el Cloruro de Isometamidium, garantizando mejor difusión y biodisponibilidad de ambos principios activos con una sola aplicación.

IVERMECTINA

Es el fármaco más utilizado en el tratamiento eficaz de parásitos gastrointestinales, pulmonares, así como ácaros, miasis y garrapatas. Este medicamento se ha incorporado en los planes sanitarios para controlar los parásitos, incrementando la producción de los rebaños.

CLORURO DE ISOMETAMIDIUM

Es el fármaco de elección en el tratamiento de la trypanosomosis bovina debido a:

- Es un trypanocida quimioproláctico: único en su género, con efecto curativo y preventivo.
Efecto curativo: es debido a que bloquea el metabolismo de las proteínas de los trypanosomas, y en consecuencia se eliminan totalmente estos hemoparasitos del torrente sanguíneo.
Efecto preventivo: se debe a que después de su administración, se va difundiendo progresivamente desde el punto de inyección, obteniéndose concentraciones terapéuticas sostenidas durante un lapso de 2 a 6 meses, dependiendo de la población de vectores, la tasa de infección en la zona afectada y la sensibilidad de las cepas infectantes.
- Es el trypanocida con mayor efecto profiláctico en el tiempo de 2 a 6 meses de acción.
- Es el menos tóxico, el de mayor margen de seguridad, que no presenta efectos patogénicos y teratogénicos.



HEMOVEEX S.O.

ENDO - ECTO - HEMOPARASITICIDA

Asociación terapéutica eficaz en el tratamiento preventivo y curativo de la Trypanosomosis y el tratamiento antihelmíntico y ectoparasiticida bovino en dosis única.

“LA SOLUCIÓN, CON UNA SOLA APLICACIÓN”
Sencillo, Seguro y Efectivo.

