

**GUÍA DE USO CORRECTO
EN EL CAMPO**

ISOPANFORTE

**Suspensión oleosa inyectable para el tratamiento
y control de tripanosomosis y anaplasmosis en bovinos,
búfalos y pequeños rumiantes.**




ISOPANFORTE



ASPECTO DEL PRODUCTO

ISOPAN FORTE presenta una coloración marrón achocolatada, característica normal de la formulación. Esta apariencia no debe interpretarse como alteración del producto.

La agitación previa es indispensable para garantizar que cada dosis contenga la concentración adecuada de los componentes de la suspensión.



CARACTERÍSTICA TECNOLÓGICA DE LA SUSPENSIÓN

El tamaño de partícula de los ingredientes activos se controla durante el proceso de fabricación. Esta característica contribuye a reducir la irritabilidad en el punto de administración y a conseguir una liberación controlada de los ingredientes activos.

ADMINISTRACIÓN

Se recomienda utilizar aguja calibre 14 (N.º 14 x 1,5 pulgadas).

Aplicar la dosis indicada vía intramuscular profunda, preferiblemente sobre la tabla del cuello, respetando siempre la dosis recomendada para no comprometer el tratamiento.

Cuando el volumen total a administrar sea superior a 10 ml, debe dividirse en varios puntos de inyección.

¡Agitar bien, administrar intramuscular profundo y usar la aguja adecuada!
Así se garantizan resultados óptimos con ISOPAN FORTE.



1 El vial presenta una separación de fases por tratarse de una suspensión. Es del todo normal.



2 Resuspender la suspensión vigorosamente durante 15 a 30 segundos.



3 Comprobar que la suspensión se ha homogeneizado completamente.



4 Verificar que el fondo del vial no presente sedimento.