



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

ADEX-3 INYECTABLE

COMPLEJO VITAMINICO

Solución inyectable



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



ADEX-3 INYECTABLE es un complejo vitamínico compuesto por vitamina A, vitamina D3 y vitamina E que trabajan en sinergia para combatir la enfermedad de músculo blanco (distrofia muscular); ceguera y queratinización de la córnea, enfermedad del corazón de mora; raquitismo, dolor de huesos, articulaciones; pesuñas y uñas quebradizas, hipocalcemias, en especies como lo son: bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

COMPOSICIÓN

Vitamina A (palmitato).....	5.000.000 U.I
Vitamina D3 (colecalfierol).....	2.500.000 U.I
Vitamina E (tocoferol acetato).....	2.000 U.I
Excipiente c.s.p.....	100 ml

MECANISMO DE ACCIÓN:

La vitamina A actúa disminuyendo la queratinización y estimulando la producción y diferenciación de las células secretoras de mucus, favorece la espermatogénesis en machos y mantenimiento de la preñez.

La vitamina D3 interviene en la regulación del metabolismo del calcio y fosforo, incrementando la absorción intestinal y tubular del calcio, siendo además necesaria para la mineralización apropiada de la matriz cartilaginosa que se desarrolla en las epífisis óseas.

La vitamina E, es un antioxidante que previene la oxidación de los lípidos prolongando la vida biológica de los ácidos grasos poliinsaturados. Esta acción se ha equiparado con la estabilización de las membranas celulares puesto que los ácidos grasos poliinsaturados son constituyentes importantes de las membranas

La acción de todas estas vitaminas hace que ADEX-3 INYECTABLE, en su presentación farmacológica de solución inyectable sea el complemento vitamínico ideal para los bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

Bovinos, ovinos y caprinos: enfermedad de músculo blanco (distrofia muscular), ceguera y queratinización de la córnea.

Porcinos: enfermedad del corazón de mora (hepatosis dietética).

Todas las especies: raquitismo, dolor de huesos y articulaciones, pezuñas y uñas quebradizas, hipocalcemias, enfermedades que cursen con síntomas nerviosos, anémicos, dérmicos, después de tratamientos quimioterápicos intensos.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía intramuscular.

Para todas las especies: 0,5 ml/kg p.v. de ADEX-3 INYECTABLE.

EFECTOS SECUNDARIOS

- :: La administración de cantidades excesivas de vitaminas durante tiempo prolongados puede producir hipervitaminosis.
- :: Puede ocasionar acidificación urinaria y ligera diuresis.
- :: Puede aparecer irritación y dolor en el punto de inoculación.
- :: La administración en bóvidos de vitamina D3 tiende a disminuir la concentración de magnesio en sangre. Para evitar la hipomagnesemia, es imprescindible la administración de magnesio durante la última etapa de la preñez.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar en caso de hiperparatiroidismo.
- × No administrar a animales con historial conocido de hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.
- × En bovinos de raza jersey, no exceder la dosis recomendada, ya que ésta es especialmente susceptible a la toxicidad por vitamina D3, que cursa con hipocalcemia, hiperfosfatemia e hipomagnesemia.

SOBREDOSIFICACIÓN

Producto con amplio margen de seguridad, sólo en caso de que se exceda mucho la dosis pueden aparecer diarreas que remiten al suspender el tratamiento

TIEMPO DE RETIRO

No precisa.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✍ Limpiar la zona de inyección antes de su administración.
- ✍ No administrar más de 10 ml en el mismo punto de inyección.
- ✍ A pesar del tratamiento con vitaminas, el manejo y la alimentación animal deben controlarse para conseguir resultados óptimos.
- ✍ No administrar dosis excesivas de vitaminas durante el embarazo, dado su potencial efecto teratogénico.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 50, 100 y 500 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N072768

