



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

ALBENDEX 10% SUSPENSION ORAL

ANTIHELMÍNTICO



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN

ALBENDEX 10% SUSPENSIÓN ORAL es un producto de uso veterinario en forma de suspensión oral cuya fórmula contiene como ingrediente activo el albendazol. Antihelmíntico sintético perteneciente al grupo de derivados del benzimidazol con actividad contra un amplio rango de nematodos, a la dosis adecuada tiene acción contra el distoma hepático o fasciola hepática en fase adulta. Se emplea en el control de infestaciones por parásitos gastrointestinales y pulmonares en bovinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos domésticos.

COMPOSICIÓN

Albendazol 10 g
Excipientes c.s.p.....100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

El albendazol es un antiparasitario interno del grupo de los bencimidazoles. Produce su efecto sobre los parásitos al inhibir la polimeración de la tubulina, una proteína esencial para la formación de los microtúbulos, lo que es crucial para su movilidad y reproducción. También tiene acción sobre la captación de los nutrientes en el metabolismo energético al inhibir la enzima fumarato - reductasa, lo que conduce a una reducción del glucógeno, lo que provoca la muerte por inhibición del parásito.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Bovinos, ovinos, caprinos:

- ~ Tratamiento de nematodosis gastrointestinales y pulmonares, producidas por nematodos sensibles al albendazol, tanto formas adultas como larvas y huevos.
- ~ Tratamiento de teniosis producidas por *Moniezia spp.*
- ~ Tratamiento de distomatosis. No está recomendada para el tratamiento de fasciolosis aguda causada por formas inmaduras.

Caninos y felinos domésticos :

- Tratamiento de nematodosis gastrointestinales y pulmonares, producidas por nematodos sensibles al albendazol, tanto formas adultas como larvas y huevos.
- Tratamiento y control de Nematodosis por ascaridos (*Toxocara canis*, *T. cati*, *Toxascaris leonina*), Tricocefalos (*Trichuris vulpis*) y Ancylostomas (*Ancylostoma caninum*, *A. tubaeforme*, *Uncinaria stenocephala*).
- Tratamiento y control de Teniosis por *Tenia pisiformis*, *Tenia hydatigena*, *Hydtígera taeniaeformis* y *Echinococcus granulosus*.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Administrar vía oral a dosis de:

Ovinos y caprinos:

Tratamiento de nematodosis y teniosis: 5 mg/Kg p.v. (equivalente a 0,05 ml/ Kg p.v.) en dosis única.

Tratamiento de fasciolosis: 7,5 mg/Kg p.v. (equivalente a 0,075 ml/ Kg p.v.) en dosis única.

Ovejas: en el primer mes de gestación, no debe rebasar en 1 ½ veces la dosis profiláctica contra fasciola.

Bovinos:

Tratamiento de nematodosis y teniosis: 7,5 mg/kg p.v. (equivalente a 0,075 ml/ Kg p.v.) en dosis única.

Tratamiento de fasciolosis: 10 mg/Kg p.v. (equivalente a 0,1 ml/Kg p.v.) en dosis única.

Caninos y felinos:

Tratamiento de Nematodosis 1ml/ 10 kg p.v. (10 mg de Albendex 10%/ p.v., dos veces al día (mañana y noche) tratar 3 días seguidos.

Teniosis 1ml/ 10 kg p.v. (10 mg de Albendex 10%/ p.v., dos veces al día (mañana y noche). Tratar 5 días seguidos. Se recomienda repetir el tratamiento a los 21 días.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar en los primeros 45 días de gestación.
- × No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a los compuestos de tipo bencimidazol.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Algunos animales pueden experimentar efectos secundarios tales como:

Dolor abdominal, náusea, vómito, cefalea, mareo, vértigo, dolor epigástrico, leucopenia, granulocitopenia, pancitopenia, agranulocitosis, trombocitopenia, erupción, urticaria, exantema cutáneo, prurito y diarrea.

Durante el tratamiento de la enfermedad hidatídica se han reportado aumentos en el nivel de las enzimas hepáticas.

Asimismo, durante el tratamiento de la neurocisticercosis se han reportado casos de elevación de la presión intracraneal.

SOBREDOSIFICACIÓN

El margen de seguridad del producto es de 5 veces la dosis terapéutica.

La sintomatología que pudiera aparecer por ingestión fortuita por encima de la dosis expresada es: anorexia, letargia, pérdida de peso e incoordinación motora.

Tratamiento: administrar un fármaco emético.

TIEMPO DE RETIRO

Carne de ovinos y caprinos : 10 días. **Bovinos:** 14 días.
Leche: 4 días.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

Durante la administración evitar el contacto con piel y mucosas. Si el producto contacta con la piel o mucosas lavarse con agua.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 50, 200 mL, 1 L y 1 Galón.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N071882
N° de registro Honduras: MV-14343



Laboratorios
REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
RIF: J-07524745-0