



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

AMITRAZ 12,5% REVEEX

FORMAMIDINA ACARICIDA

Solución emulsionable externa



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



AMITRAZ 12,5% REVEEX es un acaricida y ectoparasiticida organonitrogenado no sistémico con acción de contacto, muy utilizado por su amplio espectro de aplicaciones Y baja toxicidad. Se emplea en el tratamiento preventivo y curativo de infestaciones por garrapatas, ácaros y piojos en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

COMPOSICIÓN

Amitraz	12,5 g
Excipientes c.s.p.....	100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

El amitraz se comporta como un antagonista octopaminérgico. La octopamina es una amina adrenérgica semejante a noradrenalina que en los invertebrados actúa como una neurohormona, neurotransmisor o modulador de la actividad neuromuscular. La acción letal del amitraz es el resultado de una estimulación continua al ocupar receptores octopaminérgicos, provocando trastornos locomotores y la muerte del parásito.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



**Bovinos (destinados a la producción de carne y leche),
ovinos y caprinos:**

Tratamiento y control de infestaciones por garrapatas del género (*Boophilus microplus* y *Amblyoma cajennese*) y ácaros de la sarna (*Sarcoptes scabiei*, *Psoroptes ovis*, *Chorioptes bovis*) y piojos (*Linognatus spp.*, *Haematopis spp*, *Damalia bovis*).

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Baño por aspersión, inmersión o baño por ducha:

Especie	Dilución Recomendada	Dosis por 10L de agua	Modo de Aplicación	Observaciones
Bovinos	1:700	14,3 mL	Aspersión, inmersión, baño por ducha	Eficaz contra garrapatas, piojos y ácaros. Repetir cada 7-10 días.
Ovinos	1:700 – 1:1000	10 – 14,3 mL	Aspersión o baño	Evitar en ovejas preñadas o animales debilitados.
Caprinos	1:800 – 1:1000	10 – 12,5 mL	Aspersión o baño	Mayor sensibilidad cutánea. Usar dilución más suave.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Se puede experimentar efectos secundarios tales como: Somnolencia, letargia, depresión y anorexia. Estos efectos se evidencian en alrededor del 30% de los pacientes hasta 36 horas después del tratamiento. Pueden darse reacciones cutáneas locales a continuación del contacto dérmico (irritación, eritema, prurito) que se resuelve al cesar el contacto.

CONTRAINDICACIONES

- × No usar en equinos ni felinos.
- × No tratar animales menores de 3 meses.

SOBREDOSIFICACIÓN

Producto moderadamente tóxico los síntomas atribuidos a la sobredosis son: hipotermia, hipotensión, bradicardia, excitación con dosis bajas y depresión al aumentar la dosis. No existe un antídoto específico y el tratamiento debe ser sintomático.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 7 días.

Leche: 24 horas.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

Antes de administrar el tratamiento:

- ☐ Debe utilizarse equipo de protección: guantes, mascarilla y ropa apropiada.
- ☐ El baño debe contar con techo, para evitar la entrada de agua lluvia y evaporación.
- ☐ Evitar aplastamientos y lesiones al momento del bañado, deberá contarse con una Puerta de Corte al inicio de la rampa de salto, que facilite el flujo de los animales.

Durante la administración del tratamiento:

- ☐ Evitar el contacto con ojos, piel y mucosas.
- ☐ Aplicar en lugar ventilado. No utilizarlo dentro de la zona del ordeño o donde pueda originarse una contaminación del agua (estanques, acequias, ríos), por ser tóxico para los peces.
- ☐ No comer, beber ni fumar durante la aplicación.

Después de la administración del tratamiento:

- ☐ Lavarse con abundante agua y jabón las manos, cara y partes de la piel que hayan entrado en contacto con el producto.
- ☐ Almacenar el envase cerrado en un lugar fresco, alejado de alimentos y forraje.
- ☐ Destruir los envases de forma segura. No reutilizar los envases vacíos.
- ☐ No perforar el envase ni tirarlo al fuego, ni siquiera vacío.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Almacenar en su envase original, herméticamente cerrado en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 286 mL y 1 L.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana

N° de registro: INSAI2041PN01II055443

N° de registro Panamá: MV-9698

