



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

**AMOXICILINA TRIHIDRATO
1000 mg/g AGUA-VEX**

ANTIBACTERIANO

**Polvo para administración
sobre el alimento**



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



AMOXICILINA TRIHIDRATO 1000 mg/g AGUA-VEX el producto formulado es un polvo que contiene el 100% en peso de trihidrato de amoxicilina para ser incorporado a los piensos pellet, especialmente diseñado para el tratamiento de Furunculosis en salmón Atlántico, causada por *Aeromonas salmonicida*.

COMPOSICIÓN

Amoxicilina trihidrato.....1000 mg
Excipientes c.s.p.....1 g

MECANISMO DE ACCIÓN:

La amoxicilina es un medicamento que se usa para tratar infecciones causadas por bacterias. Es un tipo de antibiótico que pertenece al grupo de las penicilinas. Este medicamento elimina a las bacterias destruyendo su pared protectora. Funciona contra muchos tipos de bacterias, tanto las gram-positivas como las gram-negativas. Sin embargo, algunas bacterias pueden ser resistentes. La forma en que la amoxicilina actúa es bloqueando ciertos procesos que las bacterias necesitan para formar su pared. Sin esa pared, las bacterias se vuelven débiles, especialmente mientras están creciendo, y terminan rompiéndose y muriendo.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

Salmón atlántico.

Furunculosis en salmón Atlántico, causada por *Aeromonas salmonicida*.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Administración sobre el alimento.

Posología:

Administrar 80 mg por kg de peso vivo por día. La duración recomendada es de 10 días.

Método de administración:

El producto debe incorporarse sobre el pienso granulado inmediatamente antes de su administración. Las tasas de incorporación varían dependiendo de la temperatura del agua, por lo que es conveniente medicar en base a un porcentaje fijo. Las siguientes tasas de inclusión proporcionarán la dosis recomendada:

Ingesta diaria por % peso vivo	Tasa de inclusión		
	Por 5 kg de pienso	Por 25 kg de pienso	Por tonelada de pienso
0,5	80 g	400 g	16 kg
1	40 g	200 g	8 kg
2	20 g	100 g	4 kg

Instrucciones para una correcta administración:

Para ayudar a la adhesión del producto se adiciona aceite de pescado o vegetal en la superficie del pienso granulado durante el mezclado hasta que el pienso se humedezca ligeramente. El pienso medicado debe estar seco antes de administrarlo a los peces.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Infecciones secundarias por microorganismos no sensibles tras su uso prolongado.

CONTRAINDICACIONES

× No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 500 grados-día.

SOBREDOSIFICACIÓN

No se han descrito. La amoxicilina presenta un amplio margen de seguridad.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✓ Ante cualquier proceso infeccioso es recomendable la confirmación bacteriológica del diagnóstico y la realización de una prueba de sensibilidad a la bacteria causante del proceso.
- ✓ Cuando se utilice este medicamento deben tenerse en cuenta las recomendaciones oficiales (nacionales o regionales) sobre el uso de antimicrobianos.
- ✓ Lavar las manos después del uso del medicamento veterinario.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 1 kg, 5 kg, y 20 kg.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N0520663

