



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

BOLDENONA REVEEX

ANDRÓGENO

Solución Inyectable



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN

BOLDENONA REVEEX es un anabólico de rápido efecto y larga acción en solución oleosa inyectable para equinos que ofrece la posibilidad de lograr un incremento y mejora de la masa corporal, así como lograr una ganancia óptima de peso.

COMPOSICIÓN

Boldenona undecilenato 50 mg
Excipiente c.s.p. 1 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

Los mecanismos de acción de la **BOLDENONA REVEEX** se basa en los siguientes principios:

- Actúa favoreciendo el incremento de la masa muscular a través de diversos mecanismos fisiológicos al aumentar la retención de nitrógeno.
- Es miotrópico pues actúa en el citoplasma de la célula muscular, promueve en el núcleo la liberación de la enzima alfa reductasa, permitiendo al ARN aprovechar los aminoácidos y proteínas (nitrógeno) de la dieta para transformarlos en tejido muscular.
- Igualmente, posee la acción de retener calcio, fosforo, potasio y cloruros. Esta acción contribuye a un mayor desarrollo de los huesos, constituyéndose además en un factor de crecimiento, siempre y cuando se mantengan las dosificaciones recomendadas.
- Estos procesos constructivos de mineralización y consolidación permiten, además, la regeneración ósea en casos de raquitismo y osteomalacia.
- Estimulo del apetito por medio de regulación metabólica.
- Favorece la absorción de los nutrientes adquiridos por la dieta o suministrados como suplemento.
- Estimula la eritropoyesis en órganos como bazo y medula ósea al estimular la síntesis de eritropoyetina a nivel renal

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



EQUINOS

Esteroides anabólicos de rápido efecto y de acción prolongada, utilizado en la consecución de aumento de peso corporal y desarrollo de la estructura ósea.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía intramuscular

Equinos: 1 ml de BOLDENONA REVEEX /90 Kg p.v. Puede repetir la dosis a los 10 y 45 días.

EFFECTOS SECUNDARIOS

En animales jóvenes puede presentarse osificación prematura. En el caballo puede presentarse aumento de la libido que se contrarresta disminuyendo la dosis.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar a animales en gestación o en Lactancia
- × No administrar en casos de tumores malignos (carcinoma de la glándula mamaria y próstata, adenoma anal).
- × No usar en potros menores de 6 meses.
- × No usar por vía intravenosa.

SOBREDOSIFICACIÓN

La administración de dosis superiores a las recomendadas puede producir efectos androgénicos prolongados: (Agresividad excesiva y comportamiento difícil de manejar, Inquietud e irritabilidad, Hiperactividad y Agresión territorial).

Manifestaciones sistémicas: Virilización en yeguas (desarrollo de características sexuales masculinas), Alteración o ausencia del ciclo estral (pseudogestación), Eritrocitosis (aumento de glóbulos rojos), Trombocitosis (aumento de plaquetas), Retención de sodio y agua (edema).

Hepatotoxicidad: Ictericia colestática (coloración amarillenta de mucosas), Prurito (rascado excesivo), Elevación de enzimas hepáticas (ALT, AST, GGT, fosfatasa alcalina), En casos severos: peliosis hepática, adenoma o carcinoma hepatocelular.

Otros efectos: Hiperplasia prostática en machos, Infertilidad en hembras, Cambios de comportamiento (anhedonia, fluctuaciones del humor, agitación).

TIEMPO DE RETIRO

No precisa.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✦ No mezclar en la misma jeringa o envase con cualquier otra sustancia ajena al producto.
- ✦ Conservar las condiciones de asepsia y antisepsia antes y durante la aplicación del producto.
- ✦ El uso en animales reproductores y la duración del tratamiento depende del criterio de médico veterinario.
- ✦ Para obtener un efecto adecuado, es importante mantener una adecuada ingestión de proteínas, calorías, vitaminas, hierro y cobre.
- ✦ Puede aparecer una ligera tumefacción en el sitio de inoculación, la cual desaparece a los pocos días sin necesidad de tratamiento.
- ✦ No fumar ni comer durante la manipulación del producto.
- ✦ Debido a su capacidad para retener sodio y agua, los anabólicos no deben ser usados en animales con nefritis intersticial crónica; si los efectos masculinizantes son muy severos, se debe disminuir la dosis o discontinuar el tratamiento.
- ✦ Aplicaciones muy frecuentes en animales jóvenes, pueden generar osificación prematura y cese de crecimiento.
- ✦ Evite su uso en forma excesiva pues puede dar origen a efectos virilizantes no deseados y aparición de agresividad.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

- ✓ Conservar el envase dentro del estuche de cartón .
- ✓ Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.
- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 100 y 250 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N071557

