



**LABORATORIOS  
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

## **FICHA TÉCNICA**

# **BOVINET**

**ANTIPARASITARIO - ENDECTOCIDA**

**Solución Inyectable**



**USO VETERINARIO**

## DESCRIPCIÓN

**BOVINET** Solución inyectable antiparasitaria-endectocida de extra larga acción. Recomendada para el tratamiento, control y profilaxis de infestaciones por nematodos gastrointestinales y pulmonares, así como también para los ectoparasitosis (piojos, sarnas, miasis y garrapatas). Posee un mecanismo de absorción lenta y de eficacia prolongada, que elimina los parásitos indicados y previene nuevas infestaciones por largos periodos (efecto profiláctico).

## COMPOSICIÓN

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Ivermectina .....      | 3,15 g |
| Excipiente c.s.p. .... | 100 mL |

## MECANISMO DE ACCIÓN:

La ivermectina es un derivado de la avermectina, su actividad antihelmíntica se basa en su capacidad para unirse a canales iónicos específicos en las membranas celulares de los parásitos. Siendo así interrumpidos los impulsos nerviosos, con lo cual paraliza y mata los parásitos. Además, la ivermectina se une a canales cloro dependientes de glicina, este efecto interfiere con la transmisión sináptica del sistema nervioso del parásito, reduciendo su movilidad y capacidad para alimentarse provocando su muerte.

## ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Está indicado en el tratamiento y control de parasitosis internas (nematodos gastrointestinales pulmonares) y externas en bovinos, ovinos y caprinos.



## ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

**Vía subcutánea** a nivel del cuello o por delante de la paleta.

Puede ser administrada con una jeringa automática o convencional. Se recomienda a razón de 1 mL por cada 50 kg de peso vivo (630 mcg de ivermectina/kg peso vivo).

## INTERVALO ENTRE DOSIS:

| PARASITOS INTERNOS                                | DÍAS |
|---------------------------------------------------|------|
| <i>Haemonchus</i> spp.                            | 42   |
| <i>Ostertagia ostertagi</i>                       | 49   |
| <i>Trichostrongylus</i> spp.                      | 42   |
| <i>Cooperia</i> spp.                              | 42   |
| <i>Oesophagostomum</i> spp.                       | 49   |
| <i>Dictyocaulus viviparus</i>                     | 63   |
| Larvas de tercer estadio                          | 49   |
| PARASITOS EXTERNOS                                | DÍAS |
| <i>Boophilus microplus</i> (garrapata común)      | 75   |
| <i>Dermatobia hominis</i> (nuche)                 | 140  |
| <i>Haematobia irritans</i> (Mosca de los cuernos) | 28   |

## EFFECTOS SECUNDARIOS

Se puede manifestar con muy poca frecuencia reacciones de hipersensibilidad; si aparecieran, interrumpir el tratamiento.

La reacción local (inflamación) puede ocurrir en el lugar de la inyección en los animales hasta una semana después de la administración.

## CONTRAINDICACIONES

- × No administrar por vía endovenosa ni intramuscular.
- × No administrar a animales en mal estado general, en estados febriles, ni en situaciones de estrés intenso.
- × No mezclar en la misma jeringa o envase con cualquier otra sustancia ajena al producto.
- × Los envases o cualquier residuo del producto, deben eliminarse en forma segura (enterrándolos o incinerándolos) ya que la ivermectina en forma libre afecta los peces y otros organismos acuáticos.

## SOBREDOSIFICACIÓN

Amplio margen de seguridad. No obstante, de presentarse problemas de sobredosificación, realizar un tratamiento sintomático. Los síntomas de intoxicación consisten en temblor, convulsiones y coma.

## TIEMPO DE RETIRO

**Carne;** Bovinos: 122 días, Ovinos y Caprinos; 150 días.

**Leche:** No usar

## PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✦ Inyectar vía subcutánea.
- ✦ Utilizar equipo estéril de inyección y desinfectar la zona de aplicación para disminuir el riesgo de infección por Clostridium; dichas infecciones en el caso de aparecer serán agresivamente tratadas con los antibióticos adecuados. Se recomienda que los animales a tratar sean previamente vacunados frente a dichas infecciones.
- ✦ En dosis mayores a 10 ml se recomienda dividir la dosis y aplicar en uno o más puntos de inyección.

## PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

## PRESENTACIÓN

Contenido neto: 50, 100, 250 y 500 mL.

**Venta bajo prescripción del médico veterinario**

**Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana**  
**N° de registro: INSAI2041PN33N0717764**  
**N° de registro Honduras: MV-07598**

