



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

BRONCOVEEX SOLUCIÓN ORAL

MUCOLÍTICO – EXPECTORANTE

Solución oral

USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN

BRONCOVEEX SOLUCIÓN ORAL es un mucolítico, secretolítico y expectorante que se proporciona diluido en el agua de bebida con función coadyuvante en enfermedades respiratorias de aves, cerdos, rumiantes y equinos.

COMPOSICIÓN

Bromhexina (clorhidrato).....1 g
Excipientes c.s.p.....100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

La Bromhexina es un medicamento que ayuda a reducir la densidad del moco en el sistema respiratorio, facilitando su eliminación. Funciona estimulando la producción de moco más fluido y menos denso, lo que restablece el equilibrio natural. Al hacerlo, las vías respiratorias quedan más despejadas, mejorando la respiración en animales que tienen enfermedades respiratorias. Este medicamento actúa rápidamente después de ser administrado por vía oral, ya que se absorbe fácilmente en el cuerpo.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Aves, bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos:

Esta indicado por su acción mucolítico secretolítico y expectorante como un eficaz coadyuvante en la profilaxis y tratamiento de las enfermedades respiratorias agudas o crónicas que cursen con moco viscoso bronquial en aves, porcinos, bovinos y equinos. Es útil en reacciones postvacunales de las aves.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Administrar por vía oral.

Dosis farmacológica:

- **Aves:** 0,02 mg por kg de peso.
- **Cerdos, bovinos y equinos:** 20 ml / 40 kg (equivalente a una dosis de 0,5 mg de bromhexina por kg).
Oral disuelto en el agua de bebida por 5 a 7 días.
- **Para aves de corral:** 100 ml en 1000 L de agua.
- **Cerdos:** 0,2 a 0,5 ml / animal.
- **Lechones:** 0,1 a 0,25 ml / animal.
- **Becerras:** 0,3 a 0,7 ml / animal.
- **Bovinos y equinos:** 1 a 1,5 ml / animal.

El periodo de tratamiento es durante 5 a 7 días continuos.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Producto con amplio margen de seguridad. Se han informado sobre efectos gastrointestinales leves. En raros casos pueden presentarse reacciones alérgicas, incluyendo erupciones cutáneas, broncoespasmo, angioedema y anafilaxis.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con:

- × Edema pulmonar.
- × En periodos de lactancia y gestación.
- × Equinos: No administrar a animales sospechosos de trastornos digestivos.

Bromhexina se excreta en la leche materna. Aun cuando no se deberían esperar los efectos desfavorables sobre los lactantes amamantados, no se recomienda la utilización de BRONCOVEEX en las hembras durante la etapa de lactación.

SOBREDOSIFICACIÓN

En casos de sobredosis accidental o errores al administrar el producto, los síntomas que se presentan suelen ser los mismos que los efectos secundarios conocidos cuando se usa correctamente. En estas situaciones utilizar un tratamiento de sostén.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: aves y porcinos: cero días **bovinos, ovinos y caprinos:** 2 días.

Leche: No usar la leche de los animales tratados para consumo humano.

Huevos: No usar los huevos de los animales tratados para consumo humano.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

No se ha descrito.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 1 L y 3,785 L.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N075059.

