



**LABORATORIOS  
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

## **FICHA TÉCNICA**

# **BRONCOVEEX TABLETA**

**MUCOLÍTICO – EXPECTORANTE**



**USO VETERINARIO**

## DESCRIPCIÓN



**BRONCOVEEX TABLETA** es una tableta cuyo principio activo es la bromhexina que actúa incrementando la remoción del moco por su acción mucolítico y secretolisis, disminuyendo la viscosidad del mucus, y fragmentando las fibras de los mucopolisacáridos, favoreciendo la tos productiva, descongestionando la tráquea, bronquios, pulmones y todo el tracto respiratorio en caninos y felinos domésticos.

## COMPOSICIÓN

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Bromhexina (clorhidrato)..... | 10 mg  |
| Acido tartárico.....          | 150 mg |
| Excipiente c.s.p.....         | 200 mg |

## MECANISMO DE ACCIÓN:

La bromhexina actúa ayudando a que las secreciones en el sistema respiratorio sea menos espeso y más fácil de eliminar. Lo logra activando una enzima que aumenta la producción de ciertas sustancias llamadas sialomucinas, las cuales son clave para mantener las secreciones con la consistencia adecuada. De esta manera, rompe las fibras que hacen las secreciones sean más densas, lo que permite que se vuelvan más líquidas y pueda eliminarse con facilidad. Gracias a este efecto, mejora la respiración en perros y gatos al despejar las vías respiratorias.

## ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



**Perros y gatos:** Mucolítico- Expectorante.

En infecciones y afecciones de las vía respiratorias que cursen con un incremento de la producción anormal de moco y/ o su viscosidad, en particular; bronquitis, bronconeumonía, traqueítis, neumonía, laringitis, y rinitis; para facilitar la expectoración y calmar la tos.

En infecciones respiratorias administrar junto con antibióticos y /o quimioterápicos.

## ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Administrar por vía oral.

Las tabletas se administrarán directamente o, bien mezcladas o desmenuzadas con una pequeña cantidad de alimento. No es necesaria una dieta específica.

**Cachorros, perros pequeños y gatos:** ¼ tableta / 5 kg p.v. /día.

**Perros medianos:** ½ tableta /10 kg p.v. /día.

**Perros grandes:** 1 tableta / 20 kg p.v. /día.

Administrar durante 5 días seguidos.

## EFFECTOS SECUNDARIOS

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: ronchas, edema, picazón, dificultad para respirar, náusea, mareos, dispepsia, diarrea.

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que el cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte al médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: molestias gastrointestinales, mareos, sudoración

## CONTRAINDICACIONES

× No administrar en animales con edema pulmonar.

## SOBREDOSIFICACIÓN

Producto con amplio margen de seguridad, En caso de sobredosificación no existe riesgo de toxicidad, ya que la bromhexina incluso administrada a dosis muy superiores a las recomendadas es totalmente atóxica

## TIEMPO DE RETIRO

No precisa.

## PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

No se han descrito.

## PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

## PRESENTACIÓN

Contenido neto: estuche con 2 blíster y 6 tabletas cada uno.

**Venta bajo prescripción del médico veterinario**

**Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana**  
**N° de registro: INSAI2041PN33N075182**

