



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

CARNIVIT AMINO

VITAMÍNICO

Solución oral



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



CARNIVIT AMINO es un complejo que aporta una serie de vitaminas y aminoácidos indispensables en el desarrollo de los animales, así como en estados carenciales, capaz de subsanar rápida y eficazmente aquellos problemas de producción animal subsidiarios de estados hipoproteicos, ya por un aporte insuficiente en las raciones, dificultades de absorción o metabolismo de las proteínas.

COMPOSICIÓN

Vitamina A Palmitato 1,6 MUI/g.....	325.000 UI
Vitamina D3 40.MUI/g.....	100.000 UI
Vitamina E acetato.....	4,50 g
Vitamina B1 clorhidrato.....	2,85 g
Vitamina B2-5-fosfato sódico.....	3,20 g
Vitamina B6 clorhidrato.....	1,80 g
Biotina.....	0,05 g
Nicotinamida.....	10,00 g
Dexpantenol.....	5,00 g
Carnitina clorhidrato.....	12,50 g
Betaina 30%.....	83,33 g
L-Arginina.....	3,75 g
L-Glicina.....	7,50 g
L-Lisina clorhidrato.....	12,90 g
DL-Metionina.....	5,50 g
L-Triptófano.....	1,80 g
L-Treonina.....	3,20 g
Excipientes c.s.p.....	1000 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

Es un complejo inyectable de vitaminas, minerales y aminoácidos especialmente indicado en la prevención y tratamiento de las deficiencias orgánicas.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Bovinos, equinos, porcinos, aves, ovinos, caprinos, conejos**

- En periodos de desequilibrio y deficiencias en la alimentación.
- Durante la convalecencia subsiguiente a infecciones víricas o bacterianas, o a infestaciones parasitarias como recuperador orgánico.

- En periodos de stress (vacunación, transporte, cambio de local).
- Durante la muda de las aves.
- Como activador del crecimiento y estimulante de la producción animal.
- En periodos de lactación y gestación.
- Afecciones que cursan con dolencia hepática (hígado graso) o como protector hepático.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía oral en el agua de bebida.

Aves:

En general: 1-2 ml/litro de agua de bebida/día, durante 5 días.

Como promotor del crecimiento: 0.5 ml / litro de agua de bebida/día, durante los primeros 5 días de vida o después de la vacunación contra gumboro o sobre los 30 días, durante 5 días.

Porcinos:

Lechones lactantes: 2 ml / litro de agua de bebida/día.

Cerdos de engorde: 1 ml / litro de agua de bebida/día.

Cerdas en lactancia: 2 ml / litro de agua de bebida/día.

Administrar durante 5 días.

Bovinos, ovinos, caprinos:

Animales jóvenes: 1 ml / litro de agua de bebida/día.

Animales adultos: 0.5 ml / litro de agua de bebida/día.

Administrar durante 5 días.

Conejos: 2 ml / litro de agua de bebida/día, durante 7 días.

Pájaros:

Muda: 2 ml/litro de agua de bebida/ el primer día y 1 ml /litro de agua de bebida/día, hasta su terminación.

Otros tratamientos: 2ml/litro de agua de bebida/día durante 5 días.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Reacciones alérgicas de variada intensidad pueden producirse en muy raras ocasiones en animales previamente sensibilizados.

La frecuencia de las reacciones adversas se debe clasificar conforme a los siguientes grupos:

- Muy frecuentemente (más de 1 animal por cada 10 presenta reacciones adversas durante un tratamiento)
- Frecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales tratados por cada 100)

- Infrecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales tratados por cada 1.000)
- En raras ocasiones (más de 1 pero menos de 10 animales tratados por cada 10.000)
- En muy raras ocasiones (menos de 1 animal tratados por cada 10.000, incluyendo casos aislados).

CONTRAINDICACIONES

- × No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente.

SOBREDOSIFICACIÓN

La administración de dosis elevadas y/o durante periodos prolongados de vitaminas liposolubles puede llegar hasta estados de toxicidad, conocidos como hipervitaminosis. En casos de hipervitaminosis puede aparecer descamación de la piel, hepatomegalia, falta de apetito y pérdida de peso. La sobredosis de colecalfiferol se manifiesta mediante hipercalcemia, vómitos, sed, estreñimiento, poliuria, polidipsia y deshidratación; en casos crónicos puede dar lugar a calcificación vascular asintomática y/o deposición de calcio en el riñón.

La administración de dosis elevadas y/o durante periodos prolongados de piridoxina puede dar lugar a la aparición de manifestaciones tóxicas como ataxia, debilidad muscular y descoordinación. En caso de sobredosificación, los síntomas que pueden aparecer son reducción de la ingesta, del peso y del crecimiento

TIEMPO DE RETIRO

No precisa

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

El agua medicada debe prepararse en el momento de su consumo ya que las vitaminas se descomponen rápidamente en presencia de calor, luz y oxígeno.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Almacenar entre 15 a 30 ° C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 100 mL, 1 L y 18 L.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N0525266

