



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

CHAMPÚ ANTIMICÓTICO K

ANTIMICÓTICO

Champú medicado



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



CHAMPÚ ANTIMICÓTICO K es una solución jabonosa cuya acción es por contacto sobre la superficie de la piel. El ketoconazol ejerce su efecto alterando la síntesis de la membrana celular de los hongos. Alivia la descamación y el prurito, que se asocian generalmente con la dermatitis seborreica.

COMPOSICIÓN

Ketaconazol 2 g
Excipientes c.s.p.....100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

El Ketoconazol es un derivado dioxolano-imidazol sintético que actúa como fungistático o fungicida (a dosis elevadas) impidiendo la síntesis de ergosterol (por inhibición de la enzima lanosterol 14-alfa dimetilasa dependiente del citocromo P-45032) alterando la permeabilidad de la membrana fúngica.

La absorción percutánea de ketoconazol es despreciable, ya que los niveles plasmáticos no son cuantificables, incluso después de una aplicación crónica. Por tanto, no son de esperar efectos sistémicos.

Su acción es por contacto sobre la superficie de la piel. El ketoconazol ejerce su efecto alterando la síntesis de la membrana celular de los hongos. Alivia la descamación y el prurito, que se asocian generalmente con la dermatitis seborreica.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Caninos y felinos domésticos:**

Tratamiento de dermatitis seborreica en las que estén involucrados hongos de los géneros *Microsporum*, *Trichophyton* y *Epidermophyton*, *Candida*, *Sporothrix*, *Coccidioides*, *Aspergillus* y *Malassezia*.



FORMA DE USO Y VIA DE ADMINISTRACION

1. Humedecer por completo el pelaje, aplicar el **CHAMPÚ ANTIMICÓTICO K** de forma generosa, frotar y masajear principalmente el área afectada.
2. Dejar actuar el principio activo por unos 10 a 15 minutos antes de enjuagar con abundante agua.
3. Repetir si es necesario.
4. El tratamiento varía de acuerdo con el cuadro clínico de cada animal y a recomendación del médico veterinario tratante.

OTRAS OPCIONES DE USO

Caninos: 20 mL para un animal de talla y pelaje medio.

Felinos domésticos: 5 a 10 mL.

Dejar actuar por 10 a 15 minutos. Enjuagar hasta remover toda la espuma. Repetir la operación y, finalmente, enjuagar el animal hasta dejar la piel limpia.

Como tratamiento inicial, la primera semana, bañar los animales diariamente, después cada tercer día. Controlado el problema, seguir la frecuencia normal de baño.

La frecuencia y la duración del tratamiento quedan a criterio del médico veterinario.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Reacciones alérgicas, irritación de la piel y sequedad

La siguiente tabla muestra las reacciones adversas que se han notificado con el uso de este medicamento tanto en los ensayos clínicos como durante la experiencia post-comercialización e incluye las reacciones adversas mencionadas en el párrafo anterior.

Las categorías de frecuencia se definen usando el siguiente convenio: muy frecuentes ($\geq 1/10$); frecuentes ($\geq 1/100$ a $< 1/10$); poco frecuentes ($\geq 1/1.000$ a $< 1/100$); raras ($\geq 1/10.000$ a $< 1/1.000$); muy raras ($< 1/10.000$); frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles).

Clasificación por órgano y sistema.	Reacciones adversas al medicamento.			
	Categorías de frecuencias			
	Frecuentes ($\geq 1/100$ a $< 1/10$)	Poco frecuentes ($\geq 1/1.000$ a $< 1/100$)	Raras ($\geq 1/10.000$ a $< 1/1.000$)	Frecuencia no conocida
Infecciones e infestaciones		Foliculitis		
Trastornos del sistema inmunológico		Hipersensibilidas		
Trastorno de la piel y el tejido subcutáneo	Sensación de quemazón en la piel	Alopecia, textura anormal del pelo, Erupción bullosa, dermatitis de contacto, exantema, exfoliación de la piel, piel pegajosa oleosa	Acné, trastorno de la piel	Angioedem a, cambios en el color del pelo, Urticaria
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración	Eritema en el lugar de administración, prurito en el lugar de administración	Sangrado en el lugar de administración, malestar en el lugar de administración, sequedad en el lugar de administración, inflamación en el lugar de administración, irritación en el lugar de administración, parestesia en el lugar de administración, reacción en el lugar de administración		

El laurilsulfato de sodio puede provocar reacciones cutáneas locales (como picazón o sensación de ardor) o aumentar las reacciones cutáneas provocadas por otros medicamentos cuando se aplican en la misma zona

CONTRAINDICACIONES

- × No usar en caso de hipersensibilidad a sus componentes.

SOBREDOSIFICACIÓN

- ☐ No se prevé la sobredosificación debido a su uso exclusivamente externo.
- ☐ La aplicación cutánea excesiva puede causar eritema, edema y sensación de quemazón que desaparecerán tras suspender el tratamiento.
- ☐ En el caso de ingestión accidental se aplicará terapia sintomática apropiada. Para evitar la aspiración, no se debe provocar emesis ni realizar lavado gástrico.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- No ingerir, producto de uso externo.
- Lavarse las manos después del uso.
- No reutilizar el envase vacío.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 200, 400 mL, 1 L y 1 galón.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N0530080

