



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

CIPER-VEEX 20%

PIRETROIDE ECTOPARASITICIDA

Solución Emulsionable



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN

CIPER-VEEX 20% es un ectoparasitocida y acaricida piretroide de uso externo, formulado como concentrado emulsionable, con una concentración de 200 g/L de cipermetrina como ingrediente activo. Pertenece al grupo de los piretroides sintéticos y actúa principalmente por contacto sobre el sistema nervioso de los ectoparásitos, provocando hiperexcitación, parálisis y muerte de insectos y ácaros.

En medicina veterinaria se emplea como antiparásitario externo en bovinos, ovinos, caprinos y, según la formulación autorizada, para el control de garrapatas, piojos, ácaros, moscas y tábanos, mediante baños de aspersión, inmersión, fumigación de instalaciones o aplicación tópica localizada.

COMPOSICIÓN

Cipermetrina.....	20 g
Excipientes c.s.p.....	100 ml

MECANISMO DE ACCIÓN:

Sobre el insecto origina una excitación primaria del sistema nervioso periférico, que hace que el insecto agite sus miembros y alas, alejándose del lugar de tratamiento (flushing-out).

Se absorbe a través del exoesqueleto quitinoso de los artrópodos, bloqueando la transmisión del impulso nervioso, provocando parálisis del SNC, quedando el insecto paralítico y al no poder alimentarse, muere por inanición. En insectos adultos, también impide o altera la ovoposición y la eclosión de larvas.

INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO



CIPER-VEEX 20%, es un garrapaticida indicado para *Bóvidos*, *óvidos* y *cerdos*: control de moscas y otros ectoparásitos como garrapatas, ácaro de la sarna *Dermanyssus gallinae* y piojos *Lignonatus spp.*, *Haematopinus spp.* .

Especies de destino: Bóvidos, óvidos, cerdos y aves de corral.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía tópica (aspersión, inmersión o pulverización).

Bovinos, Ovinos y Porcinos.

Baños por aspersión: diluir 150 ml de CIPER-VEEX 20% /200 L de agua.

Baño por inmersión: diluir 1 L de CIPER-VEEX 20% / 1333 L de agua.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Sobre el insecto origina una excitación primaria del sistema nervioso periférico, que hace que el insecto agite sus miembros y alas, alejándose del lugar de tratamiento (flushing-out).

Se absorbe a través del exoesqueleto quitinoso de los artrópodos, bloqueando la transmisión del impulso nervioso, provocando parálisis del SNC, quedando el insecto paralítico y al no poder alimentarse, muere por inanición. En insectos adultos, también impide o altera la ovoposición y la eclosión de larvas.

Actúa como modulador de canales de sodio en el sistema nervioso de los ectoparásitos, produciendo descarga anormal de impulsos nerviosos, convulsiones, parálisis y posterior muerte.

Es un producto de acción rápida por contacto, con efecto residual de varios días a semanas, dependiendo de la dosis, especie, condiciones ambientales y tipo de aplicación.

INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO



CIPER-VEEX 20%, es un garrapaticida indicado para *Bóvidos, óvidos y cerdos*: control de moscas y otros ectoparásitos como garrapatas, ácaro de la sarna *Dermanyssus gallinae* y piojos *Lignonatus spp.*, *Haematopinus spp.*

Especies de destino: Bóvidos, óvidos, cerdos y aves de corral.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía tópica (aspersión, inmersión o pulverización).

Bovinos, Ovinos y Porcinos.

Baños por aspersión: diluir 150 ml de CIPER-VEEX 20% / 200 L de agua.

Baño por inmersión: diluir 1 L de CIPER-VEEX 20% / 1333 L de agua.

CONTRAINDICACIONES

No usar en animales con hipersensibilidad conocida a la cipermetrina o sus excipientes.

SOBREDOSIFICACIÓN

- ▶ El modo de empleo del producto hace improbable una intoxicación por sobredosificación.
- ▶ En caso de intoxicación por ingestión oral masiva aparece excitación y convulsiones que progresan a parálisis y fibrilación muscular pudiendo producirse la muerte por insuficiencia respiratoria. Usar carbón activado si hubo ingestión y tratar sintomáticamente.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 7 días; **Leche:** 7 días.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

Las personas que manipulan el producto deben llevar ropa de protección, guantes y botas de goma. Cuando se administre el producto en forma de pulverización utilizar gorro y mascarilla. Evitar contacto con piel y ojos; si esto ocurriera, lavar inmediatamente con abundante agua.

No comer, beber ni fumar durante su manipulación. Lavar las manos y piel expuestas al producto después del trabajo y antes de comer.

Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos.

En caso de derrames, absorber el producto con arena o aserrín y lavar las superficies contaminadas con una solución detergente.

Utilizarlo en un medio ambiente bien ventilado, evitando el contacto del producto con los ojos del animal.

No utilizarlo dentro de la zona del ordeño o donde pueda originarse una contaminación del agua (estanques, acequias, ríos), por ser tóxico para los peces.

Lavar la ubre antes del ordeño.

No pulverizar cuando exista amenaza de lluvia. En caso de lluvias dentro de las primeras 24 horas de realizado el pulverizado, se deberá repetir el mismo.

Destruir envases y restos de forma segura; no contaminar con ellos las aguas continentales. No quemarlo ya que su combinación produce gases tóxicos.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: Envases de 286 ml y 1 L

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN01II056952

