



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

CIPERZURON

INSECTICIDA

Solución emulsión externa

USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



CIPERZURON es un insecticida-acaricida de amplio espectro con efecto adulticida, larvicida y ovicida de uso en el entorno ganadero. Actúa de forma sinérgica sobre insectos adultos (cipermetrina), larvas y huevos (diflubenzurón).

COMPOSICIÓN

Cipermetrina.....	60 mg
Diflubenzurón.....	60 mg
Excipientes c.s.p.....	100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

La cipermetrina es un poderoso insecticida que actúa directamente sobre el sistema nervioso de los insectos. Su mecanismo de acción se basa en alterar el flujo de ciertos minerales esenciales, como el potasio y el sodio, a través de la membrana de las neuronas, lo que interrumpe la transmisión nerviosa. Como resultado, el insecto sufre una parálisis progresiva que finalmente lo lleva a la muerte. El diflubenzurón es una benzoilfenil úrea halogenada, efectivo insecticida por ingestión y contacto que actúa como regulador del crecimiento de los insectos (IGR), interfiere con el proceso natural de la muda, al inhibir la síntesis de quitina y afectar la formación de cutícula del insecto (fundamental para el crecimiento y desarrollo normal).

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Porcinos, bovinos, caprinos, ovinos

Bovinos, ovinos y caprinos: lucha y control de infestaciones por garrapatas (*Boophilus microplus*, *Amblyomma cajennense*), moscas (*Haematobia irritans*, *Musca doméstica*, *Stomoxys calcitrans*, *Musca autumnalis*, *Hydrotaea irritans*), ácaros de la sarna (*Sarcoptes scabiei*, *Psoroptes ovis*, *Chorioptes bovis*) y piojos (*Linognathus spp.*, *Haematopinus spp.*, *Damalinia bovis*).

Porcinos: lucha y control de infestaciones por ácaros de la sarna (*Sarcoptes scabiei var. suis*), piojos (*Haematopinus suis*) y moscas.

VÍA DE APLICACIÓN Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Baño por aspersión o baño por inmersión:

Bovinos: diluir 1 litro de CIPERZURON en 700 l de agua.

Ovinos, caprinos y porcinos: diluir 1 litro de CIPERZURON en 350 l de agua

Dosis: diluir 85 ml en 10 L de agua para tratar 10/20 m².

Aplicar sobre las superficies donde los insectos se posan y habitan, poniendo especial atención en lugares de anidamiento y puesta de huevos, suelos, camas, paredes, rincones, huecos, muros, perímetros de naves y lugares de acumulación de materia orgánica y estiércol.

Pulverización o aspersión, diluido en agua.

Insectos voladores: 2,5 ml en 1 L de agua (0,25%).

Desinsectación habitual: 5 mL en 1 L de agua (0,5%).

Infestaciones fuertes: 10 ml en 1 L de agua (1%).

Reaplicaciones: 2,5 ml en 1 L de agua (0,25%). Utilizar 5 litros de la mezcla por cada 100 m² de superficie. Aplicar el tratamiento en ausencia de animales.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Ninguno a las dosis e indicaciones de uso recomendadas. Pueden aparecer ocasionalmente fenómenos de irritación local, incluyendo prurito, urticaria, edema y eczema.

CONTRAINDICACIONES

- × No usar en caso de hipersensibilidad conocida a los componentes de la fórmula
- × No usar en animales de menos de 1 semana de edad.

SOBREDOSIFICACIÓN

- Bradicardia, taquipnea, miosis, hiperglicemia, hipotensión, depresión central.
- En caso de intoxicación por exposición dérmica enjuagar la parte afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión oral masiva aparece excitación y convulsiones que progresan a parálisis y fibrilación muscular pudiendo llegar a producir la muerte por insuficiencia respiratoria. Generalmente no es necesario un tratamiento tras la ingestión. Pueden administrarse catárticos salinos o una suspensión de carbón activado. En caso de aparición de síntomas nerviosos, el antídoto recomendado es el pentobarbital.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 7 días. **Leche:** 24 horas.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN



- Evitar el contacto con ojos, piel y mucosas.
- Debe utilizarse equipo de protección: guantes, mascarilla y ropa apropiada.
- Evitar el contacto con la piel y mucosas, lavarse las manos y piel expuesta con agua y jabón tras su uso.
- Evitar el contacto con los ojos, si se produjera lavar inmediatamente con abundante agua.
- No comer, beber ni fumar durante su manipulación.
- Mantener alejado de los alimentos.
- Aplicar en zonas bien ventiladas, preferiblemente al aire libre y no inhalar los vapores.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 286 mL, 1 L y 1 galón.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
Nº de registro: INSAI2041PN01II059789

