



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

CLOPRAMID

ANTIEMÉTICO

Solución Inyectable



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



CLOPRAMID es un fármaco perteneciente a la clase de las benzamidas, tiene acción antiemética y procinética gastrointestinal (estimulante del peristaltismo y coadyuvante en el vaciamiento gastrointestinal especialmente cuando éste se encuentra retardado).

COMPOSICIÓN

Metoclopramida clorhidrato.....5 mg
Excipientes c.s.p.....1 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

La Metoclopramida es una molécula originaria de la serie de las ortopramidas. Modifica el comportamiento digestivo que actúa sobre el tránsito gastroduodenal aumentando la intensidad y el ritmo de las contracciones del estómago y provoca la apertura del píloro. Su acción central antiemética (suprime las náuseas) conduce a numerosas indicaciones en gastrología.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Caninos y felinos: tratamiento sintomático de náuseas y vómitos, principalmente en casos de:

- Gastritis dispepsia.
- Espasmo del píloro.
- Nefritis crónica.
- Intolerancia digestiva a ciertos medicamentos.
- Preparación para exploraciones del tubo digestivo.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Administrar por vía intravenosa lenta, intramuscular o subcutánea.

Caninos y felinos: la dosis de base es de 0,5 mg de Metoclopramida por kg de peso vivo.

Administrar 0,5 a 1 ml / 5 Kg de p.v. (0,5 a 1 mg de Metoclopramida/kg p.v.).

- ✦ Las inyecciones pueden repetirse a intervalos de 6 a 8 horas.
- ✦ En caso de insuficiencia renal disminuir la dosis.
- ✦ La dosis a administrar, el intervalo posológico y la duración del tratamiento la determinará el médico veterinario.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito a las dosis terapéuticas indicadas.

En tratamiento prolongados se ha observado hiperprolactinemia, tensión mamaria, galactorrea, amenorrea y / o impotencia.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales cuya estimulación de la motilidad gástrica pueda resultar perjudicial (hemorragias, obstrucción o perforación).

SOBREDOSIFICACIÓN

Por sobredosificación, puede aparecer somnolencia, desorientación y reacciones extrapiramidales que normalmente desaparecen al suspender el tratamiento.

De persistir los síntomas, se practicará lavado de estómago y medicación sintomática. Las reacciones extrapiramidales se controlan con la administración de anticolinérgicos o antihistamínicos con propiedades anticolinérgicas.

TIEMPO DE RETIRO

No procede

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✦ La administración por vía intravenosa debe realizarse lentamente.
- ✦ No administrar a hembras durante el primer tercio de la gestación.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 10 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario
Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
Nº de registro: INSAI2041PN33N071901.

