



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

COCCIREX

ANTICOCCIDIAL

Solución oral

USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



COCCIREX es una solución oral que ofrece respuesta inmediata para el control y tratamiento de las coccidiosis en los pollos de engorde, a causa de los parásitos protozoarios del género *Eimeria spp.* y coccidiosis en bovinos, ovinos, porcinos y conejos causadas por el género *Isospora*.

COMPOSICIÓN

Sulfaquinoxalina sódica.....44 g
Pirimetamina.....12 g
Excipientes c.s.p.....1000 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

Pirimetamina-sulfaquinoxalina sódica se utiliza en el tratamiento quimioproláctico y supresor de la coccidiosis producida por parásitos del género *Eimeria* e *Isosporas*.

La pirimetamina es un inhibidor de la dihidrofolato reductasa y la sulfaquinoxalina sódica es un antagonista competitivo del PABA, bloqueando así dos fases de la vía metabólica del ácido fólico esencial para la supervivencia del parásito. De esta manera se impide su división nuclear en el momento de la formación de los esquizontes dentro de los eritrocitos y en el hígado.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Porcinos, aves, conejos, terneros y corderos.

Aves: coccidiosis intestinal (y cecal) por *Eimeria tenella*, *E. necatrix*, *E. maxima*, *E. brunetti*, *E. acervulina*, *E. mivati*.

Conejos: coccidiosis hepática por *Eimeria stiedae*, coccidiosis intestinal por *E. perforans*, *E. magna*, *E. irresidua*.

Terneros y corderos: coccidiosis intestinal (y cecal) por *E. bovis*, *E. zuernii*.

Cerdos: coccidiosis intestinal (y cecal) por *Cystoisospora (Isospora) suis*.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía oral en el agua de bebida.

Aves y conejos: 1,5 ml/litro de agua de bebida/día, durante 3 días.

Retirar el tratamiento 2 días y reanudarlo administrando 1 ml/litro agua de bebida/día, durante 3 días.

Porcinos, corderos y terneros: 1 ml/10 kg p.v./día, durante 5 días.

EFFECTOS SECUNDARIOS

En periodos prolongados (superiores a 5 días) pueden darse hemorragias agudas en algunos pollos tratados; se da sobretodo en épocas cálidas del año, en este caso se requiere suplementación de vitamina K.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar a animales con procesos hemorrágicos, con alteraciones hepáticas o renales.
- × No administrar a aves reproductoras adultas, animales gestantes y rumiantes adultos.

SOBREDOSIFICACIÓN

Pueden presentarse diarreas (ceden al suspender la administración) y cristaluria (alcalinizar la orina), es aconsejable la administración de vitamina K.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: los animales tratados con el producto no deben sacrificarse para el consumo humano hasta haber transcurrido 21 días del ultimo tratamiento

Leche: no usar

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✓ Asegurarse de que los animales tienen libre acceso al agua de bebida durante el tratamiento, sobretodo en épocas cálidas del año.
- ✓ No administrar a hembras en gestación.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 1 L y 1 galón

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N071897

