



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

COCXIVET 5%

ANTICOCCIDIAL

Suspensión oral
Agitar envase antes de usar

USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



Cocxivet 5% (toltrazurilo) suspensión oral, es un anticoccidiósico de amplio espectro efectivo para el tratamiento y control de la coccidiosis en rumiantes y porcinos ejerciendo un efecto coccidicida en todos los estadíos de desarrollo intracelular de la coccidia, como son la esquizogonia/merogonia y la gametogonia.

COMPOSICIÓN

Toltrazuril 5 g
Excipientes c.s.p.....100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

El toltrazuril actúa contra todos los estadíos de desarrollo intracelular de la coccidia. Este es el motivo por el que el tratamiento de 2 días es suficiente para curar para la coccidiosis. Contra los esporozoides no es efectivo por lo que es necesario repetir el tratamiento al cabo de 5 días. El toltrazuril administrado vía oral se absorbe un 46%. Las concentraciones máximas se alcanzan en el hígado y en el riñón. El periodo de vida media es aproximadamente 2 días.

El toltrazuril es un derivado triazinónico, que tiene un amplio espectro anticoccidiósico y actividad antiprotzoaria.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Porcinos, bovinos, caprinos y ovinos.

Para la prevención y control de la coccidiosis en lechones causada por *Cystoisospora suis*.

Tratamiento y control de infecciones por coccidias en lechones causada por *Cystoisospora suis* y en bovinos causada por *Eimeria bovis*, *zuernii* y *alabamensis*.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Lechones:

Una dosis única oral de 20 mg de toltrazuril por kg de peso corporal (equivalente a 0,4 ml de COCXIVET 5% por kg de peso corporal) a los 3-5 días de edad.

Rumiantes:

Una dosis única de 15 mg de toltrazurilo por kg de peso vivo, lo que equivale a 3,0 ml de Cocxivet por 10 kg de peso vivo.

La suspensión oral debe ser agitada antes de su uso.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito.

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito.

SOBREDOSIFICACIÓN

Producto con amplio margen de seguridad.

TIEMPO DE RETIRO

Bovinos, ovinos y caprinos: 63 días. **Porcinos:** 77 días.
Leche: No usar.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ☐ Evitar el contacto con la piel y mucosas.
- ☐ Si el producto cae sobre la piel o los ojos, éstos deben lavarse inmediatamente.
- ☐ Los envases del producto y cualquier contenido residual deberán ser eliminados de forma segura y de acuerdo con las disposiciones locales vigentes.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 200 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 1 Galón, 20 L y 60 L.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N072144



Laboratorios
REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
RIF: J-07524745-0