



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

COCXIVET

ANTICOCCIDIAL

Solución oral

USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



COCXIVET es una solución oral anticoccidiana, altamente efectivo contra todas las coccidias aviarias, actuando incluso en aquellas resistentes a otros compuestos. Pertenece al grupo químico de las triazinonas simétricas, los anticoccidianos más modernos empleados hasta el día de hoy.

COCXIVET ejerce una acción farmacológica contra coccidiosa en todos los estadios de desarrollo intracelular de la coccidia, como son la ezquizogonia y la gametogonia.

COMPOSICIÓN

Toltrazuril 2,5 g
Excipientes c.s.p.....100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

El toltrazuril es un anticoccidiósico efectivo contra las diferentes especies de *Eimeria* que afectan a las aves.

Las ventajas de la administración del toltrazuril además de su eficacia, son la brevedad del tratamiento, la compatibilidad con otros coccidiostáticos con antibacterianos y con factores de crecimiento y su uso no afecta a los mecanismos de inmunidad naturales

El toltrazuril actúa contra todos los estadios de desarrollo intracelulares de la coccidia Este es el motivo por el que el tratamiento de 2 días es suficiente para curar la coccidiosis

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



efectivo contra las diferentes especies de *Eimeria* que afectan al pollo y al pavo:

Pollo: *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mivati*, *E. necatrix*, *E. tenella*.

Pavo: *E. adenoeides*, *E. meleagrimitis*.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía oral.

Tratamiento curativo: 1 mL de COCXIVET (equivalente a 7 mg de toltrazuril/kg p.v/día) / 1 L de agua de bebida, durante 2 días consecutivos. Descansar 5 días y repetir el tratamiento 2 días más.

Nota: dar únicamente agua medicamentada como agua de beber.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar a gallinas ponedoras ni a gallinas reproductoras, ni a pollonas después de la **6^{ta}** y **7^{ma}** semana de vida.
- × No administrar a animales con afecciones hepáticas y/o renales.

SOBREDOSIFICACIÓN

La administración de dosis elevadas puede originar reducción de puesta de huevos en gallinas ponedoras e inhibición de crecimiento y multineuritis en pollos de engorde.

TIEMPO DE RETIRO

CARNE:

Pollos: 14 días.

Pavos: 28 días.

HUEVOS: No usar

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✓ Dar únicamente agua medicamentada como agua de beber.
- ✓ El Cocxivet sin diluir es fuertemente alcalino, por lo que debe evitarse el contacto con la piel, mucosa y ojos, lavarse con abundante agua.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 100 mL, 1 L y 1 galón

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N072583

