



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

COLIMOX

ANTIBACTERIANO

Polvo soluble



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



COLIMOX es un producto de uso veterinario, compuesto de amoxicilina y colistina dos antibióticos de amplio espectro, actúa contra bacterias gram positivas como a bacterias gram negativas, útil para la prevención y tratamiento de enfermedades en aves. Su presentación en polvo soluble facilita la administración.

COMPOSICIÓN

Amoxicilina (trihidrato).....	200 mg
Colistina (sulfato).....	1.200.000 UI
Excipientes c.s.p.....	1 g

MECANISMO DE ACCIÓN:

La amoxicilina es un antibiótico β -lactámico que actúa sobre la pared celular bacteriana, tiene un efecto bactericida, este mecanismo es más efectivo contra bacterias grampositivas y algunas gramnegativas. La colistina actúa sobre la membrana externa de bacterias gramnegativas, tiene un efecto bactericida ya que la célula pierde su contenido y muere.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**AVES:**

Prevención y tratamiento de síntomas febriles e inflamatorios. Adyuvante sintomático en el tratamiento de afecciones bacterianas o virales (enfermedades respiratorias crónicas, cólera aviar, Gumboro, Marek, neumonía, bronconeumonía).

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía oral en el agua de bebida.

0,5 g/L de agua de bebida/ día, durante 5 días.

EFECTOS SECUNDARIOS

Puede presentar alteración de la flora microbiótica por su uso prolongado, sensibilización cuya gravedad puede variar desde una simple urticaria hasta un shock anafiláctico.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas.

No administrar en casos de úlcera gastroduodenal, insuficiencia hepática o renal, edema pulmonar. Tampoco debe administrarse a los animales hemofílicos, deshidratados o sensibles a este compuesto.

SOBREDOSIFICACIÓN

Tiene un amplio margen de seguridad en el caso de presentarse reacciones alérgicas intensas suspender el tratamiento y administrar corticoides y adrenalina.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 15 días. **Huevos:** no usar.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- Ante cualquier proceso infeccioso, es recomendable la confirmación bacteriológica del diagnóstico y la realización de una prueba de sensibilidad de la bacteria causante del proceso.
- No prolongar tratamientos más allá de 5–7 días sin supervisión veterinaria.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: Bolsa de 100 g, 500 g, 1 Kg y 5 Kg.

Venta bajo prescripción del médico veterinario
Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
Nº de registro: INSAI2041PN33N0531537

