



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

**COLISTINA REVEEX
2.050.000 UI/G**

ANTIBACTERIANO

Polvo oral



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



COLISTINA REVEEX 2.050.000 UI/G POLVO ORAL, es polvo hidrosoluble oral formado por Colistina sulfato, antibiótico que actúan contrarrestando las principales enfermedades bacterianas que producen infecciones entéricas causadas por *E. coli*, en tratamiento para Bovino (terneros), porcino, pollos y pavos

COMPOSICIÓN

Colistina sulfato.....	2.050.000 UI
Excipientes c.s.p.....	1 g

MECANISMO DE ACCIÓN:

La colistina es un antibiótico polipeptídico perteneciente al grupo de las polimixinas.

La colistina ejerce una acción bactericida en cepas de bacterias sensibles mediante la alteración de la membrana citoplasmática de la bacteria conduciendo a una alteración de la permeabilidad de la célula y pérdida de materiales intracelulares.

La colistina es bactericida y es efectiva contra bacterias Gram negativas, como las *Enterobacteriaceae* y en particular *Escherichia coli*.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Bovinos (terneros), porcino, pollos y pavos.

Terneros, porcino, pollos y pavos: tratamiento y metafilaxis de infecciones entéricas causadas por *E. Coli* no invasiva sensible a colistina.

Debe confirmarse la presencia de la enfermedad en el rebaño antes del tratamiento metafiláctico



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Administración en agua de bebida.

Terneros y cerdos: 102.500 UI/Kg de p.v. /día (equivalente a 0,05 g de medicamento/Kg de p.v. /día), durante 3 días.

Pollos y pavos: 123.000 UI/Kg de p.v. /día (equivalente a 0,06 g de medicamento/Kg de p.v./día), durante 3 días.

La duración del tratamiento deberá limitarse al tiempo mínimo necesario para el tratamiento de la enfermedad.

El agua medicada no consumida en 24 horas debe ser desechada.

El agua medicada debe ser preparada diariamente, inmediatamente antes de ser suministrada.

El agua medicada debe ser la única fuente de bebida de los animales durante todo el periodo de tratamiento.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Ninguno conocido.

CONTRAINDICACIONES

- × No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la colistina.
- × No usar en caso de resistencia a la polimixina.
- × No usar en caballos (especialmente en los potros) ya que la colistina, debido a una alteración del equilibrio de la microflora intestinal, podría provocar una colitis asociada al uso de antimicrobianos (colitis X) normalmente relacionada con *Clostridium difficile*, que puede ser mortal.

SOBREDOSIFICACIÓN

En caso de sobredosificación aparecen problemas digestivos transitorios como reblandecimiento de heces y timpanismo.

Pueden aparecer signos de neurotoxicidad y nefrotoxicidad.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: Terneros: 14 días.
Pollos: 2 días.
Pavos: Cero días.
Porcino: Cero días.
Huevos: Cero días

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- Las personas con hipersensibilidad conocida a las polimixinas, como colistina, deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.
- Evitar el contacto directo con piel y ojos mientras se manipula el medicamento veterinario. Se recomienda el uso de guantes, gafas y mascarilla de protección durante la manipulación y la dosificación.
- Lave inmediatamente, con jabón y agua abundante, cualquier salpicadura de la piel. En caso de exposición ocular accidental, lavar con abundante agua, consulte con un médico inmediatamente, y muéstrole el prospecto o la etiqueta.
- Si aparecen síntomas tras la exposición, como una erupción cutánea, consulte con un médico y muéstrole el prospecto o la etiqueta. La inflamación de la cara, labios u ojos o la dificultad respiratoria son signos más graves que requieren atención médica urgente.
- Lávese las manos después de usar el medicamento.
- Debe evitarse la combinación con aminoglucósidos y levamisol.
- Como complemento al tratamiento, se deben introducir buenas prácticas de manejo e higiene con el fin de reducir el riesgo de infecciones y controlar el crecimiento potencial de resistencias.
- En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos veterinarios.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 y 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 200 g y 1 kg

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N0523038

