



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

DELTAMETRINA 0,75% POUR ON

**GARRAPATICIDA – MOSQUICIDA
PIOJICIDA**

Emulsión de unción dorsal continua



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN

Deltametrina 0,75% pour on es una emulsión para unción dorsal continúa indicado para el tratamiento y prevención de infestaciones:

- Bovino: piojos mordedores y chupadores, y moscas picadoras y chupadoras.
- Ovino: garrapatas, piojos, melófagos e infestaciones cutáneas por larvas de moscas.

COMPOSICIÓN

Deltametrina	7,5 mg
Excipientes c.s.p.....	1 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

La deltametrina es un ectoparasiticida del grupo de los piretroides tipo II.

Los piretroides tipo II afectan principalmente a los canales de sodio en la membrana nerviosa y causan una prolongación de larga duración del incremento transitorio en la permeabilidad de la membrana al sodio durante la excitación. Mantienen la modificación de los canales del sodio de forma persistente, despolarizan la membrana y bloquean el potencial de acción, sin causar actividad repetitiva presináptica.

Otro posible mecanismo de acción de los piretroides tipo II incluye una acción sobre el complejo receptor del GABA.

Es activo frente a:

Garrapatas: *Ixodes ricinus*, *Boophilus spp.*, *Rhipicephalus spp*

Moscas: *Musca doméstica*, *Stomoxys calcitrans*, *Haematobia irritans*, *Lucilia caprina*, *Lucilia sericata*, *Tabanus spp.*, *Hydrotoea irritans*, *Melophagus ovinus*

Mosquitos: *Anopheles spp.* (excepto *A. taeniorhynchus*)

Piojos: *Damalinia ovis*, *Solenopotes capillatus*, *Linognathus vituli*, *Linognathus ovillus*, *Haematopinus eurysternus*, *Haematopinus suis*.

La deltametrina se absorbe por vía cutánea y más del 85% del producto se excreta inalterado por orina y heces. El lugar de máxima acumulación de residuos es la grasa perirrenal.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Bovinos y ovinos:**

Ayuda al control de parasitosis externas producidas por las moscas, garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Boophilus spp.* *Rhipicephalus spp.*), Moscas (*Musca domestica* *Stomoxys calcitrans*, *Haematobia irritans*, *Lucilia caprina*, *Lucilia sericata*, *Tabanus spp.*, *Hydrotoea irritans*, *Melophagus ovinus* piojos), Mosquitos: *Anopheles spp.* (excepto *A. taeniorhynchus*), Piojos: (*Damalinia ovis*, *Solenopotes capillatus*, *Linognathus vituli*, *Linognathus ovillus*, *Haematopinus eurysternus*, *Haematopinus suis*) en ganado bovino y ovino.

MODO DE EMPLEO

Bovino:**Infestaciones por garrapatas:**

- 112,5 mg deltametrina/100 kg p.v. (equivalente a 15 ml de DELTAMETRINA 0,75% POUR-ON por cada 100 kg p.v.), en dosis única.
- A partir de 500 kg de p.v. administrar un máximo de 562,5 mg de deltametrina cualquiera que sea el peso del animal (equivalente 75 ml de DELTAMETRINA 0,75% POUR-ON).

En caso de reinfestación, repetir cada 4-5 semanas.

Infestaciones por moscas:

- Hasta 100 kg p.v.: administrar 75 mg de deltametrina por animal (equivalente a 10 ml de DELTAMETRINA 0,75% POUR-ON).
- Entre 100 y 300 kg p.v.: administrar 150 mg de deltametrina por animal (equivalente a 20 ml de DELTAMETRINA 0,75% POUR-ON).
- A partir de 300 kg p.v.: administrar 225 mg de deltametrina por animal (equivalente a 30 ml de DELTAMETRINA 0,75% POUR-ON), cualquiera que sea el peso del animal.

En caso de reinfestación, repetir cada 8-10 semanas.

Infestaciones por piojos:

- Hasta 500 kg p.v.: administrar 75 mg de deltametrina por animal (equivalente a 10 ml de DELTAMETRINA 0,75% POUR-ON).
- A partir de 500 kg p.v.: administrar 150 mg de deltametrina por animal (equivalente a 20 ml de DELTAMETRINA 0,75% POUR-ON).

En caso de reinfestación, repetir cada 8-10 semanas.

Ovino:


Infestaciones por garrapatas, piojos y *Melophagus ovinus*.

Administrar 75 mg de deltametrina por animal (equivalente a 10 ml de DELTAMETRINA 0,75% POUR-ON).

En caso de reinfestación, repetir el tratamiento con las pautas indicadas antes.

En todas las especies, aplicar el medicamento vertiendo la dosis necesaria a lo largo de la línea dorsal, desde la cruz hasta la cola.

Para los envases de 2,5 l será necesario el uso de un dispositivo dosificador adecuado.



EFFECTOS SECUNDARIOS

En muy raras ocasiones (menos de 1 animal de cada 10.000) tras la administración del medicamento, se ha podido observar eritema, prurito, hiperactividad, ansiedad e hipersensibilidad.

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito.

SOBREDOSIFICACIÓN

El modo de empleo del medicamento hace improbable una intoxicación por sobredosificación, pero en caso de observarse algún síntoma (hiperexcitación, sialorrea, náuseas) dentro de las 48 horas posteriores al tratamiento, lavar al animal con agua abundante.

TIEMPO DE RETIRO

Bovino:

Carne: 18 días

Leche: 12 horas

Ovino:

Carne: 35 días

Leche: 11 horas

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

El medicamento es de aplicación cutánea por unción dorsal continua (Pour-On).

No tratar animales en los mismos pastos en sucesivas estaciones para evitar los efectos adversos sobre la fauna del estiércol.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 150, 500, 1 y 2,5 L

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN01II057173

