



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

DICLAZURIL 2,5 %

COCCIDIOSTATICO

Solución oral

USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



Diclazuril 2,5 % solución oral es un anticoccidiósico altamente efectivo contra las especies de *Eimeria* como tratamiento y prevención en corderos causadas por *Eimeria crandallis* o *Eimeria ovinoidalis* y en terneros, causadas por *Eimeria bovis* y *Eimeria zuernii*. en las aves de corral causadas por *Eimeria tenella*, *E. necatrix*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. mitis (mivati)* y *E. máxima* y conejos.

COMPOSICIÓN

Diclazuril.....	2,5 g
Dimetilacetamida.....	70 g
Excipientes c.s.p.....	100ml

MECANISMO DE ACCIÓN:

Diclazuril pertenece al grupo de los benzenoacetónitrilos y posee actividad coccidicida frente a las especies de *Eimeria*. En función de las especies de coccidios, el diclazuril actúa tanto sobre los estadios sexuales como los asexuados del ciclo biológico del parásito y se absorbe muy poco en el tracto intestinal, por lo que es muy eficaz sobre los coccidios que se encuentran presentes en el intestino.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Aves, ovino (corderos), bovino (terneros) y conejos.

Corderos: Prevención de la coccidiosis causada por *Eimeria crandallis* y *Eimeria ovinoidalis*.

Terneros: Prevención de la coccidiosis causada por *Eimeria bovis* y *Eimeria zuernii*.

Aves: causadas por *Eimeria tenella*, *E. necatrix*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. mitis (mivati)* y *E. maxima*.

Conejos: *Eimeria magna*, *E. media*, *E. perforans*, *E. irresidua*, *E. Intestinalis*.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía oral:

Terneros, corderos:

Tratamiento: 1 ml por cada 25 kg de peso corporal, en un solo tratamiento.

Prevención: 1 ml por cada 25 kg de peso corporal, a las 4-6 semanas de nacer.

En situaciones de riesgo de contagio elevado, se recomienda un segundo tratamiento a las 3 semanas de la primera dosis.

Conejos : 0,002 ml de Diclazuril 2,5 % Oral por cada kg de peso corporal. Equivalente a 0,05 mg de diclazuril por cada kg de peso corporal; en alimento: añadir 4 ml de Diclazuril 2,5% Oral por cada 100 kg de alimento completo.

Aves de engorde:

Semana 1 : 30 ml por cada 1.000 litros de agua de bebida durante 3 días.

Semana 2 : 37 ml por cada 1.000 litros de agua de bebida durante 3 días.

Semana 3 : 44 ml por cada 1.000 litros de agua de bebida durante 3 días.

Semana 4 : 51 ml por cada 1.000 litros de agua de bebida durante 3 días.

Semana 5 : 58 ml por cada 1.000 litros de agua de bebida durante 3 días.

Semana 6 : 67 ml por cada 1.000 litros de agua de bebida durante 3 días.

Lo que equivale a 0,3 mg de diclazuril por cada kg de peso corporal al día.

EFFECTOS SECUNDARIOS

En muy raras ocasiones, se han observado efectos adversos relacionados con alteraciones gastrointestinales (como diarrea, con posible presencia de sangre), letargia y/o problemas neurológicos (agitación, postración, paresia, entre otros).

Algunos de los animales tratados pueden presentar signos clínicos de la enfermedad (diarrea), incluso si la excreción de ooquistes se ha reducido a un nivel muy bajo.

CONTRAINDICACIONES

- × No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente

SOBREDOSIFICACIÓN

Producto con amplio margen de seguridad.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: Corderos: cero días.

Terneros: cero días.

Conejos: 2 días.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✓ Después de usar la tapa extraíble, vuelva a cerrar el recipiente con la tapa original.
- ✓ Se debe administrar con una pistola de remojo. Se debe usar un equipo de empapado apropiado para permitir una dosificación precisa.
- ✓ Si se mezcla el producto con el alimento, debe utilizarse de inmediato.
- ✓ El agua potable medicada debe utilizarse en un plazo máximo de 24 horas.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 200 mL, 1 L, 1 galón y 5 L

Venta bajo prescripción del médico veterinario
Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N0517748

