



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

DOXIVEEX TABLETA

ANTIBACTERIANO Y ANTIPROTOZOARIO

TABLETAS



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



DOXIVEEX TABLETA es una forma farmacéutica en tabletas que asegura una buena administración y absorción del principio activo doxiciclina hclato obteniéndose una buena concentración plasmática que favorece el control de enfermedades de tipo bacterianas y parasitarias (*Ehrlichia*) en perros y gatos. También posee como principio activo la famotidina que evita la aparición de los efectos secundarios a nivel gástrico que ocasiona la doxiciclina administrada por vía oral.

COMPOSICIÓN

Doxiciclina hclato.....	100 mg
Famotidina.....	20 mg
Excipientes c.s.p.....	200 mg

MECANISMO DE ACCIÓN:

Las tetraciclinas son antibióticos que detienen el crecimiento y la reproducción de bacterias. Su acción se basa en interferir en la producción de proteínas que las bacterias necesitan para sobrevivir.

Lo hacen uniéndose a una parte específica de las bacterias llamada subunidad 30S, que es una pieza clave de la maquinaria encargada de fabricar proteínas. Al unirse a esta subunidad, las tetraciclinas bloquean un paso importante: impiden que el ARN de transferencia se conecte con el ARN mensajero. De esta forma, las bacterias no pueden formar proteínas esenciales y dejan de crecer.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Caninos y felinos domésticos.**

Caninos: Tratamiento curativo de la Ehrlichiosis canina (Pancitopenia tropical canina) causada por *Ehrlichia canis* y/o *Anaplasma platys* (antes llamado *Ehrlichia platys*).

Caninos y felinos: Tratamiento curativo de infecciones respiratorias, amigdalitis, neumonía, dermatitis, abscesos, infecciones genitourinarias, metritis, enteritis bacterianas.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Administrar por vía oral.

Ehrlichiosis:

La posología terapéutica es de 10 mg de Doxiciclina / kg p.v., cada 12 horas, durante 15 a 21 días seguidos.

Perros pequeños de 2,5 a 5 kg de peso: ¼ tableta / 2,5 kg p.v.

Perros pequeños de 5 a 10 kg de peso: ½ tableta / 5 kg p.v.

Perros medianos de 10 a 20 kg de peso: 1 tableta / 10 kg p.v.

Perros medianos de 20 a 30 kg de peso: 2 tabletas / 20 kg p.v.

Perros grandes de 30 a 40 kg de peso: 3 tabletas / 30 kg p.v.

EFFECTOS SECUNDARIOS

- ✓ Fotosensibilización
- ✓ En tratamientos muy prolongados pueden aparecer alteraciones digestivas por disbiosis intestinal.
- ✓ Todas las tetraciclinas tienen efecto negativo en el crecimiento y desarrollo de los huesos en los fetos y en los cachorros.
- ✓ La coloración de los dientes de los cachorros puede ocurrir, cuando se administran tetraciclinas a la madre durante las últimas 2 a 3 semanas de preñez o a los cachorros durante las primeras semanas de vida. La Doxiciclina, por su escasa interacción con el Calcio, parece menos propensa a provocar este efecto.
- ✓ Se distribuyen en la leche materna y no deben ser usadas en hembras lactantes por que se corre el riesgo de causar en los cachorros: hipoplasia dentaria, inhibición del crecimiento lineal del esqueleto y reacciones de fotosensibilidad en cachorros pequeños.
- ✓ Las reacciones de fotosensibilidad son muy raras en animales.
- ✓ Por tratamientos prolongados puede producir náuseas, vómitos y diarreas. Administrados con la comida a las dosis indicadas, no produce disturbios gastro-intestinales.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar a perros y gatos con historial conocido de hipersensibilidad a las tetraciclinas.
- × No deben ser usadas durante la preñez.
- × Se ha reportado que la Doxiciclina tiene menos efecto sobre la flora intestinal normal y menor.

SOBREDOSIFICACIÓN

No se han descrito.

TIEMPO DE RETIRO

No procede.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: Estuche 14 Tabletas (2 Blíster con 7 tabletas cada una).

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N075183

