



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

ENROAMOX

ANTIBACTERIANO

Suspensión oleosa inyectable



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



ENROAMOX es una asociación sinérgica de Amoxicilina y Enrofloxacin de acción prolongada, activas frente a un gran espectro de bacterias Gram (+) y Gram (-) así como frente a Micoplasma.

COMPOSICIÓN

Amoxicilina (trihidrato).....	100 mg
Enrofloxacin.....	50 mg
Excipientes c.s.p.....	1 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

La amoxicilina es un antibiótico bactericida de amplio espectro perteneciente al grupo betalactámico. Produce una inhibición de la pared celular bacteriana por la inhibición de transpeptidasas y carboxipeptidasas que produce un desequilibrio osmótico que destruye las bacterias en fase de crecimiento.

La enrofloxacin es una fluoroquinolona de tercera generación. Este grupo de sustancias muestra una potente acción bactericida basada en el bloqueo de la acción de la enzima ADN-girasa bacteriana.

La combinación de ambos antibióticos produce un efecto terapéutico mayor que el uso de los antibióticos de forma individual, actuando contra un amplio espectro de microorganismos grampositivos, gramnegativos y micoplasmas.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Ovinos, Caprinos, Bovinos y Porcinos**

Indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias, en infecciones gastrointestinales y síndromes diarreicos, infecciones genitourinarias causadas por enterobacterias y bacterias.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía intramuscular o subcutánea

Bovinos: 1 ml por cada 10 o 20 kg de peso vivo, dependiendo de la gravedad del caso y/o a criterio del Médico Veterinario cada 24 horas durante 3 a 5 días.

Porcinos, ovinos y caprinos: 1 ml por cada 10 kg de peso corporal del animal, cada 24 horas durante 3 a 5 días.

EFFECTOS SECUNDARIOS

- ❑ Los efectos adversos no suelen ser graves y su frecuencia de aparición es relativamente baja.
- ❑ Con una incidencia muy baja pueden producirse alteraciones del sistema nervioso central (vértigos y cefaleas) y también alteraciones de tipo hematológico y enzimático (transaminasas).
- ❑ Acción lesiva en articulaciones.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar a animales con hipersensibilidad a sus componentes.
- × No administrar a conejos, hámster o cobayas.

SOBREDOSIFICACIÓN

Producto con amplio margen de seguridad, en caso de presentarse una sobredosificación puede presentarse una alteración en el sistema nervioso central.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 14 días.

Leche: 72 horas.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✍ Utilizar equipo estéril de inyección y desinfectar la zona de aplicación.
- ✍ Lavarse las manos después de usar este medicamento veterinario.
- ✍ En caso de salpicadura accidental en los ojos, lavarse con abundante agua. Si aparece irritación, consulte con un médico inmediatamente.
- ✍ No comer, beber ni fumar mientras manipula este medicamento veterinario.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 50, 100 y 250 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N0519488

