



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

ENROFLOXACINA 20% REVEEX

ANTIBACTERIANO - ANTIMICOPLASMICO

Solución oral



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



ENROFLOXACINA 20% REVEEX, es una solución antibacteriana a base de enrofloxacin perteneciente al grupo de las quinolonas destinado al tratamiento de la enfermedad crónica respiratoria (CRD) pura o complicadas con *E. coli*, colibacilosis, salmonelosis y pasteurelosis de las aves.

COMPOSICIÓN

Enrofloxacin 20 g
Excipientes c.s.p.....100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

La enrofloxacin es una quinolona perteneciente al grupo de las fluorquinolonas. Su mecanismo de acción es por la acción sobre ADN—girasa, que cataliza el plegamiento organizado de la cadena de ADN, causando el corte de los filamentos del ADN bacteriano y consecuentemente inhibiendo la síntesis proteica y la muerte de la bacteria.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Aves (pollos de engorde, reproductores, pollitas de reemplazo)

Pollos de engorde, reproductoras, pollitas de reemplazo:

- ☐ Tratamiento curativo de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la enrofloxacin, que afecten al tracto respiratorio, intestinal y urogenital.
- ☐ Infecciones bacterianas asociadas a procesos víricos.
- ☐ Enfermedad respiratoria crónica (C.R.D) pura o complicada con *E. coli*, enteritis colibacilar, colibacilosis respiratoria, colibacilosis genital, colisepticemia, salmonelosis, pasteurelosis, coriza infecciosa, estafilococia y estreptococia.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Administrar por vía oral, en el agua de bebida.

La dosis terapéutica de enrofloxacin es de 10 a 20 mg/kg p.v. /día, lo que correspondería a una dosis de 0,05 a 0,1 ml/kg p.v./día.

Pollos de engorde de menos de 3 semanas, reproductoras pesadas de menos de 3 semanas, reproductoras ligeras de menos de 5 semanas, pollitas de reemplazo de menos de 5 semanas: 0,25 a 0,50 ml/litros (0,25 a 0,50 litros/1000 litros) de agua de bebida/día, durante 3 a 5 días.

- ✓ En caso de salmonelosis, infecciones mixtas o procesos crónicos, tratar durante 5 días como mínimo.
- ✓ En casos graves, administrar la dosis más alta (20 mg/kg p.v.) y mantener el tratamiento durante los días indicados.

EFFECTOS SECUNDARIOS

- ☐ Efectos gastrointestinales (nauseas, anorexia y vómitos) tienen baja incidencia.
- ☐ Alteraciones del sistema nervioso central (vértigos, cefaleas).
- ☐ Alteraciones de tipo hematológico y enzimático (transaminasas).
- ☐ Acción lesiva en articulaciones.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar a animales con insuficiencia renal o hepática ni a aquellos que hayan demostrado sensibilidad a las quinolonas.
- × No debe ser administrado a animales recién nacidos.
- × No administrar en aquellos casos en que haya una infección estreptocócica previa, ya que puede existir una sensibilidad marginal de los estreptococos a la enrofloxacin.
- × No administrar a aves ponedoras cuyos huevos se destinen al consume humano.

SOBREDOSIFICACIÓN

En caso de sobredosificación pueden producirse alteraciones gastrointestinales y del sistema nervioso central. Suprimir la medicación y aplicar tratamiento sintomático.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 5 días.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

No se han descrito.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

ENROFLOXACINA 20% REVEEX debe ser conservada en su envase original, protegido de la luz directa, en un rango de temperatura entre 15°C a 30 °C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 250 mL, 1 L y 3,875 L.

Venta bajo prescripción del médico veterinario.

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N072164
N° de registro Panamá: MV-9228

