



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

ERIPRIM R (REFORMULADO)

ANTIBACTERIANO

Polvo hidrosoluble oral



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



ERIPRIM R es un polvo hidrosoluble oral que ofrece una solución integral para la salud respiratoria de las aves, combinando cuatro antibióticos de amplio espectro (tilosina tartrato, colistina sulfato, sulfametazina sódica y trimetoprim) con un mucolítico para prevenir y tratar eficazmente infecciones bacterianas respiratorias, aliviando la congestión y facilitando la respiración.

COMPOSICIÓN

Tilosina (tartrato).....	20 g
Sulfametacina (sódica).....	85 g
Trimetoprim.....	17 g
Colistina (sulfato).....	140.000.000 U.I
Bromhexina (clorhidrato).....	5 g
Excipiente c.s.p.....	1000 g

MECANISMO DE ACCIÓN:

La tilosina es un antibiótico que puede detener el crecimiento de bacterias o eliminarlas por completo. Es eficaz contra micoplasmas, espiroquetas, clamidias y tanto bacterias gram positivas como gram negativas. La sulfametacina bloquea la producción de ácido fólico en las bacterias, lo cual es crucial para su desarrollo. Si se combina con trimetoprim, logra un efecto más potente para eliminar las bacterias. Ambos componentes se absorben rápidamente, se distribuyen por todo el cuerpo. La colistina, es un antibiótico que actúa directamente destruyendo la membrana celular de las bacterias gram negativas, esto provoca su muerte. La bromhexina este componente ayuda a que el mucus en las vías respiratorias sea más fluido y fácil de eliminar, estimula la expulsión del mucus y facilita la expectoración.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Aves: tratamiento de micoplasmosis pura, enfermedad respiratoria crónica (C.R.D), complicada con *E. coli*, coriza infecciosa, pasteurelosis, *Mycoplasma synoviae*, prevención de complicaciones bacterianas o enfermedades virales (bronquitis infecciosa y Gumboro).

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía oral, en el agua de bebida.

2 g/litro de agua de bebida al día durante 2 días, continuar con 1g/litro de agua de bebida al día, durante 3 días más.

EFFECTOS SECUNDARIOS

En tratamientos muy prolongados pueden aparecer:
Alteraciones digestivas por disbiosis intestinal, alteraciones en el tracto urinario y riñón: cristaluria, hematuria y obstrucción renal.

CONTRAINDICACIONES

- × Contraindicado en animales con antecedente de sensibilización a las sulfamidas.
- × No administrar a animales con insuficiencias renales o hepáticas.
- × No debe ser administrado a animales recién nacidos.
- × No administrar a aves ponedoras cuyos huevos se destinen al consumo humano.

SOBREDOSIFICACIÓN

Pueden producirse alteraciones del sistema nervioso central. Si se presenta suprimir la medicación y aplicar tratamiento sintomático.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 12 días. Huevos: no usar.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

El agua medicada debe ser la única fuente de agua.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 100 g, 500 g, 1 kg y 25 kg.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana

N° de registro: INSAI2041PN33N071859

