



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

ERIPRIM

ANTIBACTERIANO

Polvo hidrosoluble oral



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN

ERIPRIM es un polvo hidrosoluble oral especialmente formulado para el tratamiento de enfermedades respiratorias y complicaciones bacterianas de enfermedades virales, efectivo contra infecciones causadas por Micoplasmosis pura de las aves. En conejos para el tratamiento de Pasteurelosis y Coriza.

COMPOSICIÓN

Tilosina (tartrato)	4,4 g
Sulfafurazol.....	8,5 g
Trimetoprim (lactato).....	1,7 g
Excipientes c.s.p.....	100 g

MECANISMO DE ACCIÓN

Tilosina tartrato: antibiótico macrólido de acción fundamentalmente bacteriostática, que inhibe la síntesis proteica bacteriana al unirse a la subunidad 50S del ribosoma, activo frente a *Mycoplasma spp.*, diversos Gram positivos y algunos Gram negativos.

Sulfafurazol: sulfonamida que inhibe competitivamente la síntesis de ácido fólico bacteriano al bloquear la dihidropteroato sintasa, impidiendo la formación de ácido dihidrofólico.

Trimetoprim lactato: potencia la acción de la sulfonamida al inhibir selectivamente la dihidrofolato reductasa bacteriana, bloqueando la conversión de ácido dihidrofólico en ácido tetrahidrofólico. La combinación sulfafurazol-trimetoprim ejerce efecto sinérgico sobre la vía del folato bacteriano y, asociada a tilosina, amplía el espectro y reduce la probabilidad de desarrollo de resistencia.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

Aves (crías y ornato): tratamiento de Micoplasmosis pura, Enfermedad Respiratoria Crónica (C.R.D), Coriza y complicaciones bacterianas de enfermedades virales.

Conejos: tratamiento de Pasteurellosis y Coriza.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía oral en el agua de bebida.

Aves cría

2 g/L de agua de bebida al día, durante 2 días, continuar con 1 g/L de agua de bebida al día, durante 3 días más.

Aves ornato y conejos: Disolver el contenido de un sobre (20 g) / 10 litros de agua de bebida/ día, durante 4 a 5 días.

EFFECTOS SECUNDARIOS

En tratamientos muy prolongados pueden aparecer alteraciones digestivas por disbiosis intestinal.

Pueden aparecer alteraciones en el tracto urinario y riñón: cristaluria, hematuria u obstrucción renal.

CONTRAINDICACIONES

- × Contraindicado en animales con antecedente de sensibilización a las sulfamidas.
- × No administrar en animales con insuficiencias renales o hepáticas.
- × No debe ser administrado a animales recién nacidos.

SOBREDOSIFICACIÓN

La sobredosificación puede producir alteraciones del sistema nervioso central, de suceder suprimir la medicación y aplicar tratamiento sintomático.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 12 días.; **Huevos:** No usar.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

El agua medicada debe ser la única fuente de agua.
Una vez reconstituido el producto tiene un periodo de validez de 24 horas. Lo que no sea consumido en ese lapso de tiempo debe ser desechado.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: cajas con 25 sobres de 20 g cada uno, 100 g, 1 kg, 5 kg y 25 kg.

Venta bajo prescripción del médico veterinario
Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N072561
N° de registro Nicaragua: MV-8530

