



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

ESTROVET

PROGESTAGENO

Suspensión inyectable



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



ESTROVET es un producto de uso veterinario cuyo principio activo es un progestágeno sintético. Está estrechamente relacionado con la hormona natural del cuerpo lúteo, la progesterona. Por su forma farmacéutica de suspensión acuosa inyectable y su administración por vía subcutánea, presenta un efecto retardado que permite mantener la inhibición del celo durante un período prolongado (aproximadamente 6 meses en las perras y de 3-4 en las gatas), con el objetivo de evitar acoplamientos y fecundaciones indeseables o las molestias ocasionadas por el celo (flujos, comportamiento sexual).

COMPOSICIÓN

Medroxiprogesterona (acetato)..... 25 mg
Excipientes c.s.p.....1 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

El acetato de medroxiprogesterona es un esteroide de síntesis con una estructura química y propiedades similares a las de la progesterona, pero con la particularidad que es de 20 a 30 veces más activa que ésta, tanto como agente progestacional como inhibidor de la ovulación.

El efecto primario del acetato de medroxiprogesterona consiste en la inhibición de la secreción de hormonas gonadotróficas por la hipófisis mediante el mecanismo de retroalimentación, de manera que se impide o detiene el desarrollo de folículos y cuerpos lúteos en los ovarios.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Perras y gatas: inhibición del celo, con objeto de evitar apareamientos y fecundaciones indeseables. Tratamiento curativo de la metrorragia. Tratamiento curativo de la ninfomanía en gatas.

Perros (machos): satiriasis, excitación sexual, onanismo, hipertrófia de próstata. También está indicado en el caso de trastornos en el comportamiento social como: excitabilidad, timidez, ladridos frecuentes.

Gatos (machos): agresividad, comportamiento neurótico, autolamido excesivo, maullido persistente, dificultad de manejo.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía subcutánea. Agitar bien el frasco hasta obtener una suspensión homogénea y administrar por vía subcutánea, en el interior del pliegue del costado o del muslo.

Inhibición del celo en perras y gatas:

Perras hasta 10 kg de peso: 2 mL (50 mg)

Perras de 10 a 20 kg de peso: 4 mL (100 mg)

Perras de más de 20 kg de peso: 6 mL (150 mg)

La administración debe realizarse durante el anestro, de 3 a 5 meses después del estro precedente.

En perras de cría debe realizarse de 20 a 30 días después del destete de los cachorros.

Si se quiere continuar provocando la inhibición del estro en la perra, la inyección se puede repetir cada 6 meses

Gatas: 2 mL (50 mg) durante el anestro o bien de 15 a 20 días después del destete de las crías.

Si se quiere continuar provocando la inhibición del estro en la gata, la inyección puede repetirse cada 3 a 4 meses.

Metrorragia en perras y gatas: 2 mL (50 mg) por hembra. Generalmente se observa la curación entre 3 a 8 días después del tratamiento.

Ninfomanía en gatas: 2 mL (50 mg) por gata.

Satiriasis, excitación sexual, onanismo e hipertrofia de próstata en **perros:** 3 a 10 mL (75 a 250 mg) por perro, en función del peso.

Trastornos de comportamiento en perros y gatos:

Perros: 1 a 2 mL (25 a 50 mg) por 10 kg de peso.

Gatos: 1 a 2 mL (25 a 50 mg) por 5 kg de peso.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Ocasionalmente puede manifestarse: turgencia mamaria, lactación, aumento del apetito, aumenta ligeramente el porcentaje de aparición de piometras.

Como efecto secundario positivo, en algunas perras se desarrolla una capa de pelo más espesa y lúcida, con menor tendencia a su caída.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar en animales con enfermedades uterinas, excepto metrorragia.
- × No administrar antes o durante el primer celo, por retrasar el desarrollo sexual fisiológico.
- × No administrar en caso de tumores mamarios, gestación, piometra, proestro avanzado y animales muy obesos (hipotiroidismo).

SOBREDOSIFICACIÓN

En caso de sobredosificación accidental pueden presentarse piometras, y a largo plazo, urticaria, edema y prurito. Si se manifiesta algunos de estos casos, suprimir el tratamiento y aplicar medicación sintomática.

TIEMPO DE RETIRO

No precisa.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✍ Agítese antes de usarlo.
- ✍ Desinfectar el tapón del frasco antes de tomar cada dosis.
- ✍ Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción.
- ✍ No administrar conjuntamente con barbitúricos, fenilbutazona y clorpromazina
- ✍ La administración del medicamento debe realizarse en el interior del pliegue del costado o del muslo en razón de evitar una posible reacción local (despigmentación temporal de la piel).

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 5 y 10 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N071555

