



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

FASIOLEX 10%

SUSPENSIÓN ORAL

FASCIOLICIDA

Agitar envase antes de usar



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN

FASIOLEX 10% Suspensión oral fasciolicida, para bovinos, ovinos, caprinos, su principio activo es el Triclabendazol, el cual es un antiparasitario del grupo de los Benzimidazoles, caracterizado por ser el único fasciolicida capaz de matar formas inmaduras precoces, jóvenes y adultos del parásito. El Triclabendazol es el benzimidazol más eficaz en el control de Fasciola hepática formas adultas con una eficacia de 100% en fasciolosis de seis semanas, y un 99% de eficacia frente a formas inmaduras de hasta una semana de edad. La principal ventaja del Triclabendazol es su larga residualidad, ya que después de una sola aplicación, los huevos de Fasciola hepática se eliminan hasta por 11 semanas, permitiendo de esta manera diseñar planes preventivos y de erradicación del parásito en zonas de alta incidencia.

COMPOSICIÓN

Triclabendazol.....10 g
Excipiente c.s.p.....100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

El triclabendazol con acción antihelmíntica controla las infestaciones de Fasciola hepática estadios inmaduros y adultos de Fasciola hepática y Fasciola gigantica en especies ganaderas.

Los mecanismos de acción serían: degeneración de los microtúbulos, los benzimidazoles que se unen a estas estructuras se unen al monómero de la subunidad β , no dejando incorporar el mismo al polímero de tubulina. De esta manera, las moléculas de (BDZ) provocan una disrupción en el equilibrio microtubulo/tubulina, desencadenando su despolarización. Además interfiere en la toma y transporte de glucosa, inhibe la actividad de la fumarato reductasa e interfiere en la producción de energía. Los efectos sobre los parásitos son: disminución de los procesos energéticos, efecto ovicida, y disturbios en los procesos secretorios como el aparato de Golgi, liberación de acetilcolina y síntesis proteica.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Bovinos, Ovinos y Caprinos :

Control y tratamiento de la Fasciolosis

Se recomienda su utilización en el Tratamiento de casos clínicos instaurados y control de infestaciones parasitarias causadas por formas inmaduras tempranas, desde una semana, inmaduras y adultas de Fasciola hepática y Fasciola gigantica.

Puede ser utilizado incluso en animales en gestación o muy debilitados.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Agitar el envase antes de su utilización.

Administrar vía oral con una pistola dosificadora, en dosis única.

Bovinos : 12 ml de FASIOLEX 10 % / 100 kg p.v. (12 mg de triclabendazol / kg p.v.), en dosis única.

Peso (kg)	Dosis (ml)
50	6
100	12
150	18
200	24
250	30
300	36
350	42
400	48
450	54
500	60

Ovinos y caprinos : 1 ml de FASIOLEX 10 % / 10 kg p.v. (10 mg de triclabendazol / kg p.v.), en dosis única.

Modo de administración:

Para el tratamiento de rutina, debe administrarse la dosis a intervalos de 8-10 semanas durante la época de lluvias. Es importante adecuar la pauta en cada zona según la pluviosidad y la temperatura. Para el tratamiento de brotes agudos y subagudos, administrar una dosis inmediatamente después de diagnosticada la enfermedad y repetir en intervalos regulares de 6 semanas. Durante la estabulación, dar una dosis a las 2 semanas de comenzar ésta. Tratar los animales de leche en período seco hasta 7 días antes del parto.

CONTRAINDICACIONES

No tiene Contraindicaciones o limitaciones de uso

SOBREDOSIFICACIÓN

Producto con amplio margen de seguridad.

La sintomatología que pudiera aparecer por ingestión fortuita por encima de la dosis expresada es: anorexia, letargia, pérdida de peso e incoordinación motora.

Tratamiento: Suspender la medicación e instaurar tratamiento sintomático.

Reacciones de hipersensibilidad.

TIEMPO DE RETIRO

CARNE: 28 días

LECHE: 12 días

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

Utilizar sólo la vía de administración señalada. No aplicar por la vía endovenosa.

El producto es bien tolerado excepto en casos de obstrucción biliar transitoria en algunos pacientes con fasciolosis.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 200 mL, 1 L y 5 L

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N072558

