



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

FENIVEEX 4% PREMIX

ANTIBACTERIANO

PREMEZCLA MEDICAMENTOSA

USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



FENIVEEX 4% PREMIX es una premezcla antimicrobiana que contiene el antibiótico de amplio espectro florfenicol macróido probado ampliamente, de elevada eficacia en el tratamiento de enfermedades respiratorias en cerdos causadas por microorganismos susceptibles al florfenicol.

COMPOSICIÓN

Florfenicol.....4 g
Excipiente c.s.p.....100 g

MECANISMO DE ACCIÓN:

El florfenicol es un antibiótico sintético de amplio espectro del grupo de los fenicoles que es activo frente a la mayoría de las bacterias Gram-positivas y Gram-negativas aisladas de animales domésticos. El florfenicol actúa por inhibición de la síntesis proteica a nivel ribosomal y es bacteriostático.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Porcinos.**

Para el tratamiento y metafilaxis de la enfermedad respiratoria porcina en granja infectadas debido a *Pasteurella multocida* sensible al florfenicol. La presencia de la enfermedad debe ser establecida en la granja antes de iniciar el tratamiento preventivo.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Para administración vía oral, en el pienso medicado.

Dosificación:

10 mg de florfenicol por Kg de peso vivo (equivalente a 250 mg de medicamento veterinario) por día, administrado durante 5 días consecutivos.

Administración:

Para la ingesta diaria de pienso de 50 g/Kg de peso vivo, esta dosis corresponde a una tasa de incorporación de 5 Kg de premezcla por tonelada de pienso, es decir, 200 ppm de florfenicol.

La tasa de incorporación de la premezcla medicamentosa en el pienso puede ser incrementada hasta alcanzar la dosis requerida en base al peso vivo (mg/kg) y teniendo en cuenta la ingesta de pienso exacta. Por lo tanto, el nivel de inclusión puede necesitar ajustarse de la siguiente manera para suministrar la dosis correcta:

$$\frac{250 \text{ mg de medicamento veterinario por Kg de peso vivo y día}}{\text{Ingesta media de pienso diaria (Kg/animal)}} \times \text{peso vivo medio del cerdo (Kg)} = \text{mg de medicamento veterinario por Kg de pienso}$$

La tasa máxima de incorporación es 12,5 Kg/tonelada (500 ppm de florfenicol), tasas de inclusión más elevadas pueden conducir a palatabilidad baja y disminuir el consumo de pienso.

En ningún caso la tasa de incorporación de la premezcla debe ser menor de 5 Kg/tonelada de pienso.

En cualquier caso la dosis recomendada de 10 mg de florfenicol por Kg de peso vivo por día, durante 5 días consecutivos tiene que respetarse.

Para asegurar una dosis correcta, se debe determinar el peso vivo con la mayor precisión posible para evitar la infradosificación. Las dosis requeridas deben medirse con equipos de pesaje calibrados adecuadamente.

Este medicamento veterinario debe ser incorporado por los fabricantes de pienso bajo supervisión regulada. Para su incorporación deben usarse mezcladoras calibradas.

Se recomienda que el medicamento veterinario sea añadido al mezclador que contiene los componentes del pienso y sea mezclado a fondo para producir un pienso medicado homogéneo. El medicamento veterinario puede ser incorporado en pienso granulado acondicionado previamente con vapor a una temperatura que no exceda los 85°C.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Los más frecuentes son diarrea, inflamación perianal y eversión rectal. Estos efectos son transitorios, resolviéndose al cesar el tratamiento. También se puede observar un incremento del calcio en el suero.

CONTRAINDICACIONES

- × No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.
- × No usar en caso de resistencia conocida al florfenicol.

SOBREDOSIFICACIÓN

En caso de sobredosificación, se puede observar una disminución en el consumo de pienso y agua, junto con un descenso en el peso vivo. Puede producirse un aumento en el rechazo del pienso y un incremento en el calcio sérico.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 14 días.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✓ El uso del medicamento veterinario fuera de las instrucciones proporcionadas en la ficha técnica, puede aumentar la prevalencia de bacterias resistentes al florfenicol y puede disminuir la efectividad del tratamiento con otros anfenicoles, debido al potencial de resistencia cruzada.
- ✓ Esta premezcla está destinada a la fabricación de pienso medicado sólido y no puede ser utilizada directamente como premezcla; la tasa de incorporación de la premezcla en pienso no puede ser inferior a 5 Kg/tonelada.
- ✓ Esta premezcla contiene carbonato de calcio, que puede conducir a una disminución en el consumo de pienso y a un desequilibrio calcio-fósforo en la ingesta de pienso., lo que debe tenerse en cuenta al considerar el contenido en calcio del pienso medicado final.
- ✓ El tratamiento no debe exceder 5 días.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 1 kg, 5 kg, 10 kg y 25 kg.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N0521293

