



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

FENIVEEX SOLUCIÓN INYECTABLE

ANTIBACTERIANO



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



FENIVEEX SOLUCION INYECTABLE es una solución antibiótica inyectable de amplio espectro, cuyo principio activo es el florfenicol, molécula perteneciente a la familia de los fenicoles. Su acción es más amplia que la de otros fenicoles debido a la sustitución del grupo hidroxilo por un átomo de flúor (mantiene su acción antibacteriana, aun en presencia de enzimas bacterianas).

COMPOSICIÓN

Florfenicol..... 30 g
Excipiente c.s.p. 100 ml

MECANISMO DE ACCIÓN:

El florfenicol es un bacteriostático para algunos microorganismos gram-positivos y gram-negativos aislados. El florfenicol imposibilita la síntesis de la proteína en el ribosoma, Se une a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, impidiendo la transferencia de peptidil y, por lo tanto, la elongación de la cadena peptídica. Este bloqueo en la síntesis de proteínas interfiere con la capacidad de la bacteria para producir proteínas esenciales para su crecimiento y supervivencia.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Porcinos, bovinos, caprinos, ovinos.

Indicado para el tratamiento de enfermedades respiratorias en bovinos, conocidas como la fiebre del transporte (BRD). Para el tratamiento terapéutico de las infecciones en el tracto respiratorio debidas a *P. haemolytica* y *multocida*.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía intramuscular. La inyección debe hacerse sólo en la musculatura del cuello. No administrar más de 10 ml en el mismo punto de inyección.

Bovino: administrar 20 mg de florfenicol/kg p.v./día (equivalente a 6,6 ml de FENIVEEX INYECTABLE/100 kg p.v./día), durante dos días consecutivos (48 horas). Se recomienda utilizar una aguja con 1,6 mm de diámetro.

Otras especies: administrar 3 ml/100 kg. p.v.

EFFECTOS SECUNDARIOS

- Falta transitoria de apetito que se recupera suprimiendo el tratamiento.
- Los efectos adversos comúnmente observados son diarrea y/o eritema perianal y rectal transitorios que pueden afectar al 50% de los animales. Estos efectos pueden observarse durante una semana. Se puede observar inflamación transitoria hasta de 5 días en el punto de inyección. Las lesiones inflamatorias en el lugar de inyección se pueden observar hasta los 28 días.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar en animales cuya leche pueda ser utilizada para el consumo humano.
- × No administrar a verracos destinados a la cría.
- × No administrar en casos de reacciones alérgicas previas a florfenicol.
- × No usar en lechones de menos de 2 kg.

SOBREDOSIFICACIÓN

- ❑ En ganado porcino tras la administración de 3 veces la dosis recomendado o más se ha observado una reducción en la alimentación, hidratación y ganancia de peso. Tras la administración de 5 veces la dosis recomendada o mas también se han observado vómitos.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 18 días antes del sacrificio.

Leche: No usar

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✍ Desinfectar el tapón antes de extraer cada dosis.
- ✍ Utilizar una jeringa y aguja secas estériles.
- ✍ No perforar el vial más de 25 veces.
- ✍ El producto debe ser utilizado junto a ensayos de sensibilidad y tener en cuenta las regulaciones antimicrobianas oficiales y locales.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, No almacenar por encima de 25°C. No refrigerar. No congelar

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 20, 100 y 250 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N072044
N° de registro ICA: 5790-DB

