



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

FENIVEEX SOLUCIÓN ORAL

ANTIBACTERIANO

Solución oral

USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



FENIVEEX SOLUCION ORAL, es un producto cuyo principio activo es florfenicol, un antibiótico sintético actúa como un bacteriostático de amplio espectro inhibiendo el crecimiento y la reproducción de las bacterias, es altamente efectivo contra numerosas bacterias gram positivas y gram negativas, como *E. coli*, *Staphylococcus spp*, *Streptococcus spp*, *Pasteurella multocida* y *Corynebacterium spp*. Esta indicado frente a tratamientos terapéuticos de infecciones entéricas y respiratorias en aves y porcinos.

COMPOSICIÓN

Florfenicol 10 g
Excipiente c.s.p 100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

El florfenicol actúa bloqueando el proceso de creación de proteínas en las bacterias. Se une a una parte del ribosoma y evita que las bacterias puedan producir las proteínas que necesitan para crecer y reproducirse. **FENIVEEX SOLUCION ORAL** su administración por vía oral cuenta con una biodisponibilidad alta distribuyéndose por diversos órganos de la vía entérica y respiratoria. El 85% de la dosis de florfenicol administrada, se elimina dentro de las primeras 24 horas post-administración, excretándose principalmente por la orina (97,6%) y en mucha menor proporción en las heces (2,4%). Por su fácil administración es recomendada en animales de granja como aves y porcinos.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Aves (pollos de engorde, pollitas de reemplazo y reproductoras). Está indicado en el tratamiento terapéutico de infecciones entéricas y respiratorias causadas por *E. coli* y otras bacterias.

sensibles al florfenicol, en pollos de engorde, pollitas de reemplazo y reproductoras, en particular para: enteritis colibacilar; colibacilosis respiratoria; colisepticemia; complicaciones con *E. coli* de enfermedades infecciosas (coriza, CRD).

Porcinos:

Tratamiento curativo de infecciones respiratorias causadas por *Actinobacillus pleuroneumoniae*, *Pasteurella multocida* y *Streptococcus suis* tipo 2.

**ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA**

Vía oral en el agua de bebida.

Aves:

Vía oral en el agua de bebida. Administrar 20 mg de florfenicol/kg p.v. /día (equivalente a 1 ml de FENIVEEX SOLUCIÓN ORAL por litro de agua de bebida/día), durante 3 a 5 días.

Porcinos:

Administración en agua de bebida. 10 mg de florfenicol por kg de peso vivo por día en agua de bebida durante 5 días consecutivos.

EFFECTOS SECUNDARIOS

En algunos casos puede presentarse falta transitoria de apetito que se recupera suprimiendo el tratamiento.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar en gallinas reproductoras o ponedoras en producción de huevos incubables o destinados al consumo humano.
- × No usar en verracos destinados a fines reproductivos. Estudios en ratas han revelado evidencias de efectos adversos potenciales en el sistema reproductor masculino.
- × No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa o al excipiente.

SOBREDOSIFICACIÓN

Una dosis de 120 mg/kg p.v. presenta una pequeña disminución en el consumo de agua y alimento y también una ligera disminución en el aumento diario de peso.

TIEMPO DE RETIRO

Porcinos: : 12 días.

Aves: 5 días.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✍ El agua medicada será la única fuente de bebida.
- ✍ Renovar todos los días el agua medicada.
- ✍ Diluir el volumen total a administrar directamente en el tanque.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 1 L y 3,785 L.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N072193

