



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

FIPROVET GAN

**GARRAPATICIDA – MOSQUICIDA
PULGUICIDA – ACARICIDA**

Solución para unción dorsal puntual



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN

Es una nueva combinación de fipronil y permetrina que ha sido desarrollada como una solución tópica para unción dorsal puntual en bovinos con el objeto de proporcionar un amplio espectro de control ectoparasitario. La formulación añade la eficacia repelente de la permetrina, frente a los flebotomos, garrapatas y mosquitos, a la eficacia insecticida y acaricida del fipronil.

COMPOSICIÓN

Fipronil.....	1 g
Permetrina.....	5 g
Excipientes c.s.p.....	100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

El fipronil es un insecticida y acaricida que ayuda a eliminar pulgas, garrapatas y piojos. Actúa sobre el sistema nervioso de los parásitos, alterando su funcionamiento y provocando su muerte. Su efecto es rápido: en menos de 24 horas acaba con las pulgas, y en aproximadamente 48 horas, con las garrapatas y los piojos.

Por otro lado, la permetrina es un insecticida y repelente que protege contra diversos parásitos, como mosquitos y garrapatas. Su acción se basa en afectar el sistema nervioso de estos organismos, causando su hiperactividad y posterior eliminación. En productos veterinarios, proporciona una protección eficaz, manteniendo alejados a los insectos durante varias semanas.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Bovino (s)

Tratamiento y control de la mosca de los cuernos, garrapatas, nuche (tupe o ura), piojos masticadores, chupadores y miasis (gusaneras).

MODO DE EMPLEO

Bovinos: La dosis recomendada es de 1 mL por cada 10 kg de peso vivo, correspondiente (a 1 mg de fipronil por kg p.v. y a 50 ppm de permetrina)

Aplicar en el dorso del animal 1 ml/10 kg del producto listo para su uso, en el espacio entre la cruz y la base de la cola.

Aplicar tropicalmente a lo largo de la línea dorsal que se extiende desde la cruz hasta la base de la cola.

Para resultados óptimos **FIPROVET GAN** Pour On debe aplicarse a todos los animales del hato dentro de un programa planificado de control de parásitos externos.

El intervalo de tratamiento puede ser de al menos 2 meses, pero dependerá de la severidad de la infestación, condiciones ambientales y condiciones del centro de crianza. Consulte a su Veterinario para determinar el momento más adecuado para el tratamiento.

EFFECTOS SECUNDARIOS

En muy raras ocasiones se han observado después de la aplicación del medicamento veterinario reacciones cutáneas transitorias en la zona de aplicación (decoloración de la piel, pérdida de pelo local, picor, rojez) así como picor general o pérdida de pelo. También se ha observado después de utilización del medicamento veterinario salivación excesiva, signos nerviosos reversibles (sensibilidad incrementada a la estimulación, hiperactividad, temblor muscular, depresión, otros signos nerviosos) o vómito.

En caso de lamido de la zona de aplicación, puede observarse hipersalivación transitoria y emesis.

CONTRAINDICACIONES

- × No presenta efectos secundarios ni incompatibilidades.
- × No aplicar el producto al animal en espacios cerrados.
- × No utilizar en animales enfermos o convalecientes.
- × No aplicar en zonas de la piel con heridas.

SOBREDOSIFICACIÓN

No se han descrito.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 100 días. **Leche:** No usar.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ☐ No reutilizar el envase vacío.
- ☐ Evite contaminar cursos de agua como ríos, arroyos, etc.
- ☐ Lavar las manos y piel expuesta luego del uso.
- ☐ De existir contacto directo con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- ☐ De existirlo en los ojos, hacerlo con abundante agua durante 15 minutos.
- ☐ Si se ingiriese, beber grandes cantidades de agua, acudiendo de inmediato al médico con esta etiqueta. Si existiese intoxicación, llevar de inmediato a emergencia y mostrar esta etiqueta al médico.
- ☐ No existe antídoto específico.
- ☐ Las personas con hipersensibilidad conocida al fipronilo y/o a la permetrina deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.
- ☐ No fumar, beber o comer durante la aplicación.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 1 Galon.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN01II0513455

