



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

FIPROVET REVEEX

ECTOPARASITICIDA

Solución para Pulverización Cutánea



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN

Fiprovect es una solución para pulverización cutánea que contiene como activo el fipronil con el objeto de proporcionar un control de ectoparásitos para las mascotas tanto caninos como felinos domésticos.

COMPOSICIÓN

Fipronil.....	0,25 g
Excipientes c.s.p.....	100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

El fipronil es un insecticida/acaricida que pertenece a la familia de los fenilpirazoles.

Actúa inhibiendo el complejo GABA, fijándose en el canal de cloruro y bloqueando de este modo la transferencia de iones cloruro a nivel pre y postsináptico a través de la membrana. Provoca así una actividad incontrolada del sistema nervioso central y la muerte de los insectos y de los ácaros.

El fipronil presenta una actividad insecticida contra las pulgas (*Ctenocephalides* spp) en el perro y el gato y contra el piojo picador (*Trichodectes canis*) en el perro y (*Felicola subrostratus*) en el gato. El fipronil presenta también una actividad acaricida contra las garrapatas (*Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus* spp, *Ixodes scapularis*, *Ixodes ricinus*), en el perro y el gato.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Caninos y felinos domésticos.

Tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides* spp) y garrapatas (*Ixodes ricinus* y *Rhipicephalus sanguineus*) en el canino.

Tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides* spp) y garrapatas (*Rhipicephalus* spp, *Ixodes ricinus*, *Ixodes scapularis*, *Dermacentor variabilis*) en el felino doméstico.

elimina las pulgas del animal tratado, por lo que puede ser utilizado como parte de la estrategia en el tratamiento de la Dermatitis Alérgica por Pulgas

Tratamiento y control de las infestaciones por piojo picador (*Trichodectes canis*) en el canino y (*Felicola subrostratus*) en el felino doméstico.

MODO APLICACIÓN

Externa, por pulverización.

A fin de que el pelo quede totalmente mojado:

1. Pulverizar toda la superficie del animal manteniendo el frasco a una distancia de 10-20 cm. Repartir de manera uniforme y a contrapelo para que todo el animal quede mojado.
2. Friccionar después de la aplicación para que el producto penetre hasta la piel.
3. Dejar que el producto se seque de forma natural. No secar con toallas.

EFFECTOS SECUNDARIOS

En caso de lamido, puede observarse un breve periodo de hipersalivación debido principalmente a la naturaleza del excipiente.

De forma esporádica se han comunicado las siguientes reacciones adversas después de la utilización del producto: reacciones cutáneas transitorias, eritema, prurito o alopecia.

Excepcionalmente, tras la administración del medicamento, se ha podido observar hipersalivación, síntomas neurológicos reversibles (hiperestesia, letargia, síntomas nerviosos, ataxia), vómitos o síntomas respiratorios. Administrar la dosis recomendada.

CONTRAINDICACIONES

- × No utilizar en animales enfermos (enfermedad sistémica, fiebre.) o Convalecientes.
- × No utilizar en conejos, ya que podrían ocurrir reacciones adversas incluso con resultado de muerte.

SOBREDOSIFICACIÓN

El riesgo de presentarse reacciones adversas puede aumentar cuando se sobredosifica, por lo tanto los animales deben ser tratados siempre con la posología correcta correspondiente a su peso corporal.

TIEMPO DE RETIRO

No procede.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ⊕ Evitar el contacto con los ojos o boca del animal.
- ⊕ Es importante asegurarse de que los animales no se lamen unos a otros después del tratamiento.
- ⊕ No se debería permitir que los perros se bañasen en arroyos o estanques durante los 2 días después de la aplicación
- ⊕ Puede haber una adhesión de garrapatas solas. Por esta razón, no se puede excluir completamente la transmisión de enfermedades infecciosas si las condiciones son desfavorables.
- ⊕ Los animales o los operarios con hipersensibilidad conocida a los insecticidas o al alcohol deben evitar el contacto con FIPROVET REVEEX
- ⊕ Evitar el contacto del producto con los dedos, si esto ocurre, lávense las manos con agua y jabón
- ⊕ Después de exposición ocular accidental, aclarar el ojo suavemente con agua pura.
- ⊕ Utilizar guantes para evitar el contacto con el producto
- ⊕ Los animales tratados no deben ser tocados hasta que el punto de aplicación del producto esté seco, y no se debería autorizar a los niños a jugar con los animales tratados hasta que el punto de aplicación estuviera seco. Por lo tanto se recomienda no tratar a los animales durante el día, sino que se trate al atardecer, y que estos animales recientemente tratados no duerman con los propietarios, especialmente con los niños.
- ⊕ No fumar, beber o comer durante la aplicación.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 50, 100 y 500 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN01II059897

