



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

FIPROVET SPOT-ON

**ANTIPARASITARIO EXTERNO EN SOLUCIÓN
INSECTICIDA-ACARICIDA**

**PIPETA DE APLICACIÓN TÓPICA
PARA EL TRATAMIENTO PREVENTIVO DE
PULGAS Y GARRAPATAS**



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN

FIPROVET SPOT-ON es un antiparasitario externo en solución, insecticida-acaricida, cuya presentación es en pipeta de aplicación tópica, para el tratamiento preventivo de pulgas y garrapatas. Contiene como compuestos activos el fipronil y el S- metopreno, para combatir de forma integral las infestaciones de pulgas, garrapatas y piojos en los perros.

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml contiene

Fipronilo.....	10 g
(S)-metopreno.....	9 g
Excipientes c.s.p.....	100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

El **Fipronilo** es un insecticida y acaricida que pertenece a la familia de los fenilpirazoles. El fipronilo y su metabolito el fipronilo sulfona actúan interaccionando con los canales de cloro regulados por ligando, en particular con los canales del neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico (GABA), así como con los canales desensibilizante (D) y no desensibilizante (N) del glutamato (Glu, único ligando de los canales de cloro en los invertebrados) bloqueando así la transferencia pre- y post-sináptica de los iones cloruro a través de las membranas celulares. Como resultado de ello, se produce una actividad incontrolada del sistema nervioso central y la muerte de los insectos y ácaros.

(S)-Metopreno es un regulador del crecimiento de los insectos (IGR) de la clase de compuestos conocidos como análogos de la hormona juvenil que inhiben el desarrollo de las fases inmaduras de los insectos. Este compuesto imita la acción de la hormona juvenil y produce un desarrollo anómalo y muerte en las diferentes etapas del desarrollo de las pulgas. La actividad ovicida del (S)-metopreno se produce tanto por la penetración directa en la envoltura de los huevos recién puestos como por la absorción a través de la cutícula de las pulgas adultas. El (S)-metopreno también es efectivo en la prevención del desarrollo de las larvas y pupas de pulga, por lo que previene la contaminación del entorno de los animales tratados por fases inmaduras de pulga

ESPECIE DE DESTINO E INDICACIONES

**CANINOS**

Tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides spp*) y garrapatas (*Rhipicephalus spp.*, *Ixodes ricinus*).

FIPROVET SPOT-ON elimina las pulgas del animal tratado, por lo que puede ser utilizado como parte de la estrategia en el tratamiento de la Dermatitis Alérgica por Pulgas (DAP).

Tratamiento y control de las infestaciones por piojo picador (*Trichodectes canis*).

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Administración de pipeta por aplicación tópica, externa sobre la piel.

- 1 pipeta de 0,67 ml por perro, cuando su peso no supere los 10 kg de peso corporal
- 1 pipeta de 1,34 ml por perro, cuando su peso se encuentre comprendido entre 10 y 20 kg de peso corporal
- 1 pipeta de 2,68 ml por perro, cuando su peso se encuentre comprendido entre 20 y 40 kg de peso corporal
- 1 pipeta de 4,02 ml por perro, cuando su peso sea superior a 40 kg.

Como parte de la estrategia en el tratamiento de la Dermatitis Alérgica por Pulgas (DAP) se recomienda una aplicación mensual en los perros alérgicos y en los que convivan con ellos.

En ausencia de estudios de seguridad, el intervalo mínimo de tratamiento es de 4 semanas.

MODO APLICACIÓN

Romper el opérculo de la pipeta **FIPROVET SPOT-ON** por la línea de puntos. Separar el pelo en la región de la escápula (o cruz), para evitar un posible lamido, hasta que la piel quede al descubierto. Colocar la punta de la pipeta sobre la piel y apretar varias veces, hasta vaciar el contenido directamente sobre la piel. Deberá evitarse humedecer el pelo en exceso, lo cual puede causar un aspecto pegajoso del pelo en el punto de aplicación. Sin embargo, si esto ocurre, desaparecerá en las 24 horas posteriores a la aplicación. En el caso de perros grandes, después de la aplicación del producto, se les debe mantener inmovilizados durante 2 minutos, para permitir que se disperse.

El producto es activo durante 2 meses frente a pulgas y durante 4 semanas frente a garrapatas. El tratamiento frente a garrapatas se hará como mínimo una vez al mes. Frente a piojos, en caso necesario, volver a tratar al animal a las 4 semanas de realizada la primera aplicación.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Reacciones cutáneas transitorias en el punto de aplicación (decoloración de la piel, pérdida de pelo local, picor, rojez) así como picor general o pérdida de pelo. También se ha podido observar salivación excesiva (en caso de lamido), signos nerviosos reversibles (sensibilidad a la estimulación incrementada, depresión, otros signos nerviosos), vómitos o síntomas respiratorios.

CONTRAINDICACIONES

El **FIPROVET SPOT ON** está contraindicado en cachorros de menos de 8 semanas de edad y / o menos de 2 kg o en animales enfermos o convalecientes. No se recomienda el uso de este producto en otras especies que no sea la indicada en la etiqueta.

SOBREDOSIFICACIÓN

El riesgo de presentarse reacciones adversas puede aumentar cuando se sobredosifica, por lo tanto los animales deben ser tratados siempre con la posología correcta correspondiente a su peso corporal.

USO DURANTE GESTACIÓN Y LACTANCIA

FIPROVET SPOT ON puede ser utilizado en perros durante la reproducción, en perras gestantes y en lactación. La formulación ha sido bien tolerada por los cachorros después de someter a tratamiento a la perra lactante.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ⊕ Evitar el contacto con los ojos o boca del animal.
- ⊕ Es importante asegurarse de que los animales no se lamen unos a otros después del tratamiento.
- ⊕ Deben evitarse baños o inmersión en agua durante los 2 días siguientes a la aplicación del producto así como baños más frecuentes que una vez por semana.
- ⊕ Antes del tratamiento, pueden utilizarse champús emolientes, pero reducen la duración de la protección frente a las pulgas a aproximadamente 5 semanas cuando se utilizan semanalmente después de la aplicación del producto.
- ⊕ Puede haber adhesión de garrapatas solas. Por esta razón, no se puede excluir completamente la transmisión de enfermedades infecciosas si las condiciones son desfavorables.
- ⊕ Las pulgas de los animales a menudo infestan la cesta, el lecho y las áreas de descanso de estos, como alfombras y cierto tipo de mobiliario que debería ser tratado, en caso de infestación masiva, con un insecticida adecuado, al inicio de las medidas de control y limpiado regularmente con aspiradora.
- ⊕ Evitar el contacto del producto con los dedos (preferiblemente usar guantes), si esto ocurre, lávense las manos con agua y jabón
- ⊕ Después de exposición ocular accidental, aclarar el ojo suavemente con agua pura.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRECAUCIONES: ELIMINACIÓN DE PRODUCTO

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse en conformidad con las normativas locales.

El fipronilo y el (S)-metopreno pueden afectar adversamente a algunos organismos acuáticos.

No contaminar estanques, arroyos o acequias con el producto o con los envases vacíos.

PRESENTACIONES

Contenido neto: Envases plásticos tipo Pipetas unidos de: 0,67; 1,34; 2,58; 3,08 y 4,02 ml.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN01II059790

