



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

FLUNICOL

ANTIBACTERIANO - ANTIINFLAMATORIO

Solución inyectable



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN

FLUNICOL es un antibacteriano y anti-inflamatorio que permite actuar rápidamente sobre los gérmenes respiratorios y bloquear inmediatamente la fase nefasta de la inflamación en los procesos respiratorios agudos origen bacteriana.

COMPOSICIÓN

Florfenicol	20 g
Flunixin base.....	2 g
Excipiente c.s.p.....	100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

La asociación florfenicol/flunixin ofrece ventajas terapéuticas significativas como medicamento de uso animal. Destaca su eficacia y rapidez gracias al amplio espectro antibacteriano del florfenicol y su excelente difusión pulmonar, junto con la acción antiinflamatoria, antipirética y antiendotóxica del flunixin. Es seguro debido a la resistencia del florfenicol a la inactivación enzimática y su mecanismo de acción específico, así como a la carencia de efectos secundarios no deseados del flunixin. La fiabilidad se asegura por la acción sostenida del florfenicol y la concentración y duración del flunixin en tejidos inflamados. Finalmente, su facilidad de uso se manifiesta en la simple aplicación y excelente tolerancia.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Bovinos: tratamiento curativo de infecciones del tracto respiratorio causadas por *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* y *Histophilus somni* (Pasteurellosis e Infecciones respiratorias); pododermatitis infecciosa causadas por *Fusobacterium necrophorum* y *Bacteroides melaninogenicus*; artritis infecciosa y Queratoconjuntivitis.

Porcinos: tratamiento curativo del Complejo Neumónico causado por *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* y *Haemophilus sp.*



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía intramuscular, en la musculatura del cuello. Utilizar una aguja estéril de 1,6 mm de diámetro.

No administrar más de 10 ml en el mismo punto de inyección.

Bovinos y porcinos: 1 ml/10 kg p.v. (equivalente a 20 mg de florfenicol y 2 mg de flunixin / kg p.v.).

El tratamiento consiste en la administración de 2 dosis con un intervalo de 48 horas.

EFFECTOS SECUNDARIOS

En algún caso, se puede producir una ligera irritación local transitoria en el punto de inyección.

Durante el tratamiento puede producirse un ligero descenso en el consumo de alimentos. Los animales tratados recuperan su apetito rápida y completamente tras finalizar el tratamiento.

CONTRAINDICACIONES

× No administrar en machos adultos utilizados con fines reproductivos.

SOBREDOSIFICACIÓN

En caso de sobredosis, se puede observar un ligero reblandecimiento transitorio de las heces que desaparece tras finalizar el tratamiento.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 28 días.

Leche: no está autorizado su empleo en hembras en lactación, cuya leche se destine al consumo humano.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✎ Utilizar una aguja estéril de 1,6 mm de diámetro.
- ✎ Después de tomar una primera dosis, utilizar el producto en 4 semanas.
- ✎ Desinfectar el tapón del frasco antes de tomar cada dosis para conseguir un ambiente aséptico.
- ✎ Utilizar jeringas y agujas estériles.

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 20, 50 y 100 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N072926



REVEEX DE VENEZUELA, C.A.
RIF: J-07524745-0