



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

FLUNIVEEX

ANTIINFLAMATORIO - ANALGÉSICO

Solución inyectable



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN

FLUNIVEEX SOLUCIÓN INYECTABLE, está formulado en base a flunixin meglumina, potente antiinflamatorio, analgésico, antipirético no esteroide-AINES. Es utilizado en bovinos, cerdos y equinos para el tratamiento de inflamaciones agudas en el tracto respiratorio, cólico equino, dolores asociados con alteraciones musculo esqueléticas, elevación de la temperatura en el caso de mastitis y metritis en cerdas.

COMPOSICIÓN

Flunixin (meglumine)..... 5 g
Excipiente c.s.p 100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

El flunixin meglumine funciona bloqueando una enzima en el cuerpo llamada COX (ciclooxigenasa). Esta enzima es responsable de producir ciertas sustancias llamadas prostaglandinas, que están involucradas en la inflamación, el dolor y la fiebre. Al inhibir la acción de la COX, el medicamento reduce la producción de estas sustancias, aliviando así los síntomas de inflamación y dolor.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Bovinos, equinos y porcinos.

Bovinos: tratamiento de la inflamación aguda asociadas con el tracto respiratorio.

Equinos: tratamiento de dolores viscerales asociados al cólico, tratamiento de inflamaciones y dolores asociados con alteraciones musculo esqueléticas

Porcinos: coadyuvante en el tratamiento e la inflamación, dolor y elevación de la temperatura relacionada con mastitis y metritis.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Bovinos y porcinos: 0,44 ml de FLUNIVEEX/10 Kg p.v.,
(equivalente a 2,2 mg Flunixin/Kg p.v) vía IV.

Repetir si es necesario a intervalos de 24 horas pero no más de 5 consecutivos.

Equinos: en dolores viscerales asociados a cólicos, se recomienda 0,22 ml de FLUNIVEEX/10 Kg p.v. (equivalente a 1,1 mg Flunixin/Kg p.v.) vía IV al iniciarse los síntomas. El tratamiento puede ser repetido 1 o 2 veces si reaparecen los síntomas.

En inflamaciones y dolores asociados con alteraciones músculo-esqueléticas, se recomienda 0,22 ml de FLUNIVEEX/10 Kg p.v. (equivalente a 1,1 mg Flunixin/Kg p.v.) vía IV o IM una vez al día durante no más de 5 días consecutivos.

EFFECTOS SECUNDARIOS

En muy raras ocasiones pueden aparecer: hemorragias, lesiones gastrointestinales, necrosis de las papilas renales, ataxia e hiperventilación.

En la especie porcina, en muy raras ocasiones, se ha observado irritación local en el punto de inyección tras la administración del medicamento.

Pueden producirse reacciones adversas como consecuencia de la administración conjunta con otros medicamentos.

CONTRAINDICACIONES

- × No usar en animales con enfermedad hepática o renal.
- × No usar cuando exista la probabilidad de úlceras o hemorragias digestivas.
- × No usar cuando existan signos de discrasias sanguíneas.
- × No usar en animales que presenten hipersensibilidad a la sustancia activa, otros antiinflamatorios no esteroideos o a alguno de los excipientes.
- × No usar en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos.

SOBREDOSIFICACIÓN

Puede producir anorexia, diarrea, úlceras gástricas, hipoproteinemia y necrosis renal. En este caso, suspender el tratamiento y aplicar terapia sintomática. También aparecen signos de incoordinación y ataxia.

TIEMPO DE RETIRO

Bovino: carne: 7 días. **Leche:** 5 días.

Porcino: 21 días.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✎ Su uso no está autorizado en yeguas en lactación cuya leche se utiliza para consumo humano.
- ✎ Los caballos destinados a carreras y competición se les debe impedir participar en competencias cuando necesiten el tratamiento y los caballos que han sido tratados recientemente deberán someterse a la normativa aplicable. Se han de tomar las precauciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las reglas de la competición. En caso de duda se recomienda un análisis de orina.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 20, 50, 100 y 250 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana

N° de registro: INSAI2041PN33N072774

