



**Laboratorios  
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

## **FICHA TÉCNICA**

# **FLURALVEX**

**ECTOPARASITICIDA – USO SISTEMICO**

**TABLETAS MASTICABLES**

**USO VETERINARIO**

## DESCRIPCIÓN



Fluralaner (micronizado) insecticida y acaricida sistémico de uso veterinario, en forma de tabletas masticables, empleado para el tratamiento de infestaciones por garrapatas y pulgas en perros. Proporciona actividad inmediata y persistente durante 12 semanas para matar pulgas (*Ctenocephalides felis*), garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus* y *D. variabilis*). Actividad inmediata y persistente durante 8 semanas para matar garrapatas como *Rhipicephalus sanguineus*.

Controla la Dermatitis alérgica por picadura de pulga (DAPP), también la demodicosis producida por *Demodex canis*. Para el tratamiento de la sarna sarcóptica (infestación por *Sarcoptes scabiei* var. *canis*). Reduce riesgo de infección por *Babesia canis* transmitida por *Dermacentor reticulatus* durante un periodo de hasta 12 semanas. El efecto es indirecto debido a la acción del medicamento sobre el vector.

## COMPOSICIÓN

Cada tableta de 300 mg contiene:

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Fluralaner (micronizado) ..... | 112,5 mg |
| Excipiente c.b.p .....         | 300 mg   |

## MECANISMO DE ACCIÓN:

Fluralaner (micronizado) insecticida y acaricida sistémico actúa inhibiendo los canales de cloruro regulados por ligando en el sistema nervioso de los artrópodos.

La absorción oral es rápida, con una eliminación lenta que asegura concentraciones efectivas durante el intervalo entre dosis.

## ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



**Caninos:** Parasitosis externas por garrapatas, pulgas y Ácaros de la sarna demodéctica y sarcóptica.

- Tratamiento de infestaciones por garrapatas y pulgas: Garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus*, *D. variabilis* y *Rhipicephalus sanguineus*) y pulgas (*Ctenocephalides felis*).
- Para el control de la Dermatitis alérgica por picadura de pulga (DAPP).
- Tratamiento de la sarna: *Demodex canis* y *Sarcoptes scabiei*.
- Reducción de riesgo de Babesiosis transmitida por *Dermacentor reticulatus*.



## ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Administrar comprimido masticable vía oral o con el alimento, a la hora o cerca de la hora de comer. en dosis única.

**Cachorros, perros pequeños:**

2 – 4,5 kg p.v.: 1 tableta ( Dosis 112,5 mg).

**Perros medianos:**

4,5 – 10 kg p.v. : 2 tabletas (Dosis 225 mg).

**Perros grandes:**

10 – 20 kg: 4 tabletas ( Dosis 450 mg).

## EFFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito.

## PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

- Utilizar con precaución en perros con epilepsia preexistente.
- En ausencia de datos disponibles, el medicamento veterinario no debe utilizarse en cachorros menores de 8 semanas de edad y/o perros que pesen menos de 2 kg.
- No debe administrarse a intervalos inferiores a 8 semanas ya que la seguridad para intervalos más cortos no ha sido estudiada.
- No usar en caso de hipersensibilidad conocida de alguna de las sustancias activas o de algún excipiente.

## SOBREDOSIFICACIÓN

No se observaron reacciones adversas después de la administración oral a cachorros de 8-9 semanas de edad con un peso de 2,0 - 3,6 kg tratados con sobredosis hasta de 5 veces la dosis máxima recomendada (56 mg, 168 mg y 280 mg de fluralaner/kg de peso) en tres ocasiones a intervalos inferiores al recomendado (intervalos de 8 semanas).

No se observaron efectos sobre el rendimiento reproductivo ni sobre la viabilidad de las crías cuando se administró por vía oral a perros raza Beagle, una sobredosis de fluralaner hasta de 3 veces la dosis máxima recomendada (hasta 168 mg de fluralaner/kg de peso).

El medicamento veterinario fue bien tolerado en perros Collies con deficiencia de la proteína 1 de resistencia a múltiples medicamentos (MDR1 -/-) después de una administración oral única de 3 veces la dosis recomendada (168 mg/kg de peso). No se observaron signos clínicos relacionados con el tratamiento.

## TIEMPO DE RETIRO

No procede.

## PRECAUCIONES PARA SU ADMINISTRACIÓN

- ✍ FLURALVEX es una tableta masticable, suave y agradable al paladar, lo que facilita su administración oral por su alta aceptación. En tal caso, que el canino no la acepte voluntariamente puede ser administrada con el alimento o abriendo la boca del animal y colocando la tableta en la parte posterior profunda de la lengua como cualquier otro medicamento, asegurarse de que se traga el comprimido.
- ✍ Esquema de tratamiento: Para un control óptimo de la infestación por pulgas, FLURALVEX debe administrarse a intervalos de 12 semanas. Para un control óptimo de la infestación por garrapatas, el tiempo para repetir el tratamiento depende de la especie de la garrapata. Para el tratamiento de infestaciones por el ácaro *Demodex canis*, debe administrarse una dosis única de FLURALVEX. Como la demodicosis es una enfermedad multifactorial, es recomendable tratar apropiadamente también cualquier enfermedad subyacente. Para el tratamiento de la sarna sarcóptica (infestaciones por *Sarcoptes scabiei* var. *canis*), debe administrarse una dosis única de FLURALVEX. La necesidad de un nuevo tratamiento y la frecuencia del mismo deben estar de acuerdo con las recomendaciones del veterinario prescriptor.

## PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

- Mantener lejos del alcance de los niños, animales y personas discapacitadas.
- Mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, temperaturas inferiores a 30° C.

## PRESENTACIONES

1, 4 y 8 tabletas.

Caja de cartón con blister de aluminio laminado sellado con una lámina de PET aluminio.

**Venta bajo prescripción del médico veterinario**

**Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana**  
**N° de registro: INSAI2041PN33N0526162**

