



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

HEMOVEEX S.O. INYECTABLE

**ANTIHELMÍNTICO – ECTOPARASITICIDA
HEMOPARASITICIDA**

Suspensión Oleosa Inyectable



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



HEMOVEEX S.O. INYECTABLE es un desparasitante inyectable elaborado con ivermectina al 2% y cloruro de isometamidio clorhidrato al 2,40% que presenta un amplio espectro de acción que es eficaz para el control y tratamiento contra parásitos internos y externos tales como vermes gastrointestinales, pulmonares, renales, cardíacos, oculares, hemoparásitos, piojos, ácaros y larvas de moscas que afectan (trypanosomosis y anaplasmosis).

COMPOSICIÓN

Ivermectina	2 g
Cloruro de Isometamidio clorhidrato.....	2,40 g
Excipientes c.s.p.....	100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

El HEMOVEEX S.O. INYECTABLE contiene ivermectina que realiza su acción antiparasitaria inhibiendo la transmisión de impulsos nerviosos y motores del parásito, al estimular la liberación del Ácido Gama Aminobutírico (GABA) en las neuronas presinápticas. Esta inhibición ocasiona parálisis y muerte del parásito; y puede afectar la producción de huevecillos y el crecimiento de las larvas en desarrollo. Y el cloruro de isometamidio que es un compuesto que pertenece al grupo de las fenantridina. El modo de acción comúnmente aceptado, de acuerdo con los mecanismos moleculares, de la actividad tripanocida de las fenantridina, es el bloqueo de la síntesis de ácidos nucleicos a través de intercalación sobre los pares de bases de la molécula de ADN.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Bovinos y ovinos: tratamiento específico de la trypanosomosis en bovinos. Actúa contra el *Trypanosoma vivax*, *T. congolense*, *T. brucei*, *T. evansi*. Hipodermosis, nematodosis gastrointestinal, nematodosis pulmonar, parasitosis externas y sarna. En todas las indicaciones señaladas anteriormente, será efectivo contra las formas parasitarias que sean sensibles a la ivermectina.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Agitar el envase antes de usar.

Vía Intramuscular profunda: Para infestaciones de moderadas a severas, para efecto sistémico más prolongado.

Vía Subcutánea: Para infestaciones leves, tiene también un efecto sistémico prolongado.

Aplicar la inyección subcutánea e intramuscular profunda, en el anca o preferiblemente en la tabla del cuello.

Se recomienda repartir la dosis total en 2 puntos de inyección distintos y dar un buen masaje en el sitio de inyección después de la aplicación.

Bovinos: 1 ml de la suspensión por cada 50 kg de peso vivo (24 mg / ml de cloruro de isometamidio y 20 mg / ml de Ivermectina) en dosis única.

Este tratamiento a la dosis indicada, permite curar y prevenir la trypanosomosis bovina durante un periodo de 2 a 6 meses, dependiendo del grado de infestación de la zona y de la sensibilidad de las capas infectantes, así como también el tratamiento y control de parásitos gastrointestinales, pulmonares, ácaros y garrapatas.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Inmediatamente después de la administración subcutánea, en algunos animales se han observado molestias pasajeras. En bovino, esto puede incluir alteraciones del comportamiento (por ejemplo, saltos), que desaparecen después de 15 minutos.

En los animales tratados se ha observado inflamación y engrosamiento de la piel en el lugar de la inyección. Estas reacciones son pasajeras y desaparecen en el transcurso de una a cuatro semanas.

CONTRAINDICACIONES

- × No usar en vacas ni en ovejas lecheras en lactación que producen leche para el consumo humano.
- × No usar en vacas lecheras en secado, incluidas las novillas lecheras gestantes, ni en ovejas lecheras en secado en los 60 días antes del parto.
- × No usar en casos de hipersensibilidad a la ivermectina.
- × No administrar por vía intravenosa.

SOBREDOSIFICACIÓN

Producto con amplio margen de seguridad.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 35 días.

Leche: No administrar a hembras cuya leche se destine al consumo humano.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✦ No aplicar más de 10 ml en cada punto de inyección.
- ✦ El uso frecuente y repetido de los antihelmínticos de una misma clase durante un extenso periodo de tiempo y la infradosificación pueden incrementar los niveles de resistencias.
- ✦ No se recomienda el tratamiento de la sarna psoróptica (sarna ovina) con una única inyección porque, aunque se manifieste mejoría clínica, es posible que no se produzca la eliminación total de los ácaros.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 250 y 500 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N0523022

