



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

**IMIDOCARBO REVEEX 85 MG/ML
SOLUCIÓN INYECTABLE**

ANTIPROTOZOARIO



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



IMIDOCARBO REVEEX es una solución inyectable antiprotozoario utilizado para el tratamiento y prevención de babesiosis y anaplasmosis en bovinos y caninos.

COMPOSICIÓN

Imidocarbo (dipropionato).....85 mg
Excipientes c.s.p.....1 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

El imidocarbo es un antiprotozoario derivado de la carbanilida. Su mecanismo de acción es poco conocido. Parece actuar directamente sobre la glucólisis del parásito y como inhibidor de la topoisomerasa II, bloqueando la replicación del ADN.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Bovinos y caninos.**

Bovino:

- Tratamiento y prevención de piroplasmosis causadas por *Babesi argentina*, *B. bigemina*, *B. bovis* y *B. divergens*.
- Tratamiento de anaplasmosis causado por *Anaplasma marginale*.

Caninos:

- Tratamiento de piroplasmosis causadas por *Babesia canis*, *B. gibsoni* y *B. vogelli*.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Caninos: Vía intramuscular o intravenosa.

Administrar de 4 a 5 mg de imidocarbo/kg de peso corporal (equivalente a 0,047 - 0,058 ml/kg p.c.) en dosis única.

Bovino: Vía subcutánea.

- Piroplasmosis:

Prevención: administrar 2 mg de imidocarbo/kg p.v. (equivalente a 0,023 ml/kg p.v.) en dosis única.

Tratamiento: administrar 1 mg de imidocarbo/kg p.v. (equivalente a 0,01 ml/kg p.v.) en dosis única.

- **Anaplasmosis:** administrar 2,1 mg de imidocarbo/kg p.v. (equivalente a 0,025 ml/kg p.v.) en dosis única.

Volumen máximo por punto de inyección: 6 ml.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Se han observado signos colinérgicos tras la administración del medicamento veterinario que pueden aliviarse administrando sulfato de atropina:

Digestivos: vómitos, cólicos, hipersalivación y diarrea.

Neuromusculares: temblores, convulsiones e intranquilidad.

Otros: taquicardia, tos, sudoración y postración.

Puede producirse una reacción local en el punto de inyección.

Se han notificado muertes por reacciones anafilácticas tras el uso del medicamento veterinario.

La frecuencia de las reacciones adversas se debe clasificar conforme a los siguientes grupos:

- Muy frecuentemente (más de 1 animal por cada 10 animales tratados presenta reacciones adversas).
- Frecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 100 animales tratados).
- Infrecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 1.000 animales tratados).
- En raras ocasiones (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 10.000 animales tratados).
- En muy raras ocasiones (menos de 1 animal por cada 10.000 animales tratados, incluyendo casos aislados).

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar por vía intravenosa en bovino.
- × No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.

SOBREDOSIFICACIÓN

- ☐ En este caso el tratamiento recomendado es la administración de sulfato de atropina.

TIEMPO DE RETIRO

Bovino: Carne: 213 días
Leche: 6 días

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✍ Desinfectar el tapón antes de extraer cada dosis.
- ✍ No manipule este medicamento veterinario si su médico le ha aconsejado no trabajar con inhibidores de la acetilcolinesterasa.
- ✍ Administrar el medicamento veterinario con precaución. En caso de autoinyección, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o etiqueta.
- ✍ Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de derrame o contacto accidental, lavar inmediatamente con agua abundante. Usar un equipo de protección personal consistente en guantes al manipular el medicamento veterinario.
- ✍ No comer, beber o fumar durante su utilización.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz. Almacenar a una temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 10, 20 y 50 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N0523037

