



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

**IRONVEEX 200 MG/ML SOLUCIÓN
INYECTABLE**

HIERRO ASIMILABLE AL 20%



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



IRONVEEX 200 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE es una solución de hierro dextrano de baja viscosidad, rápida absorción y total aprovechamiento, indicada para la prevención y el tratamiento de la anemia por carencia o deficiencia de hierro en las diferentes especies indicadas.

COMPOSICIÓN

Hierro (complejo de hierro dextrano).....200 mg
Excipientes c.s.p.....1 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

El Hierro-Dextrano es un suplemento esencial para combatir la anemia en animales, ayudando a restablecer sus niveles de hierro de manera segura y efectiva.

Una vez administrado por inyección intramuscular, el hierro se absorbe de forma progresiva a través del sistema linfático, incorporándose a la sangre en los siguientes tres días. Parte de la sustancia queda almacenada en el sitio de aplicación, mientras que el resto se distribuye por el organismo para potenciar la producción de glóbulos rojos.

Dentro del cuerpo, las células encargadas del procesamiento separan el hierro del polisacárido. Luego, el hierro libre se une a la transferrina, una proteína que lo transporta de manera eficiente a los tejidos que más lo necesitan.

Beneficios principales:

- ✓ Corrección de la anemia: mejora la salud y vitalidad del animal al garantizar un suministro adecuado de hierro.
- ✓ Absorción lenta y eficaz: su acción prolongada permite una recuperación sostenida sin causar efectos adversos.
- ✓ Fácil eliminación del exceso: el dextrano es eliminado naturalmente por la orina, evitando acumulaciones innecesarias en el organismo.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Lechones, terneros, bovinos adultos, ovinos y caprinos:**

Se utiliza para la prevención y tratamiento de la anemia ferropénica de orígenes diversos (parasitismo, enteritis y hemorragias).



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía intramuscular profunda.

Se recomienda para prevenir la anemia inyectar profundamente (técnica zeta), en la tabla de cuello o parte posterior de la pierna **una sola dosis de 1 mL (200 mg) al tercer día de nacido.**

EFECTOS SECUNDARIOS

- ✓ Puede presentarse coloración en el punto de inyección, así como reacciones locales.
- ✓ Pueden observarse reacciones de hipersensibilidad.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar a animales con hipersensibilidad conocida al ingrediente activo.
- × No administrar a animales con anemia de origen infeccioso.
- × No administrar a animales con sospecha de deficiencia de vitamina E y/o Selenio (puede resultar mortal).

SOBREDOSIFICACIÓN

- ⊕ Por una administración indiscriminada puede producirse toxicosis o almacenamiento patológico de hierro.
- ⊕ La intoxicación aguda puede resultar mortal. Para su tratamiento se recomienda el uso de quelantes.

- ⊕ Niveles de saturación de transferrina-hierro conducen a un aumento de la susceptibilidad a enfermedades bacterianas (sistémicas), al dolor, a reacciones inflamatorias, así como a la formación de abscesos en el lugar de inyección.
- ⊕ Puede producirse una decoloración persistente del tejido muscular en el lugar de inyección.
- ⊕ Intoxicación iatrogénica con los siguientes síntomas: palidez de mucosas, gastroenteritis hemorrágica, vómitos, taquicardia, hipotensión, disnea, edema de las extremidades, cojera, shock, muerte, daño hepático. Medidas de soporte como agentes quelantes pueden emplearse para su tratamiento.

TIEMPO DE RETIRO

No precisa.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✍ Desinfectar correctamente la zona antes de inocular el producto.
- ✍ Aplicar profundamente en el músculo con técnica de Z.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 20 y 100 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
Nº de registro: INSAI2041PN33N0523039

