



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

IVERMECTINA - FS

ENDECTOCIDA - FASCIOLICIDA

Solución inyectable



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN

IVERMECTINA - FS, solución antiparasitaria endectocida y fasciolicida inyectable para bovinos. La asociación de ivermectina y clorsulon ha demostrado un efecto de adición, por el cual cada medicamento cumple con su efecto por separado sin causar sinergismo, pero propiciando una combinación que facilita con una sola aplicación tratar a los animales contra trematodos, nematodos y parásitos externos sin que haya ninguna complicación.

COMPOSICIÓN

Ivermectina.....	1 g
Clorsulon.....	10 g
Excipiente c.s.p.....	100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

La ivermectina es un derivado de la avermectina, su actividad antihelmíntica se basa en su capacidad para unirse a canales iónicos específicos en las membranas celulares de los parásitos. La ivermectina estimula la descarga del ácido gamma aminobutírico (GABA) en las terminaciones nerviosas de los endoparásitos (nemátodos), y aumenta la fijación del GABA en los receptores especiales de las uniones nerviosas, siendo así interrumpidos los impulsos nerviosos, con lo cual paraliza y mata los parásitos. Además, la ivermectina se une a canales cloro dependientes de glicina, este efecto interfiere con la transmisión sináptica del sistema nervioso del parásito, reduciendo su movilidad y capacidad para alimentarse provocando su muerte.

El clorsulón es un antihelmíntico en que tiene como mecanismo de acción inhibir las enzimas que intervienen en la glucólisis de los parásitos.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Bovinos:

- ✓ Nematodosis gastrointestinal.
- ✓ Nematodosis pulmonar.
- ✓ Parasitosis externas.
- ✓ Hipodermosis (nuche, tórsalo).
- ✓ Distomatosis (fasciolasis).

En todas las indicaciones señaladas anteriormente, será efectivo contra las formas parasitarias que sean sensibles a la ivermectina y clorsulon.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía subcutánea, exclusivamente.

Se aconseja dividir las dosis mayores de 10 ml en dos puntos de inyección distintos.

Bovinos: 1 ml / 50 Kg (200 mcg de ivermectina y 2 mg de clorsulón / kg p.v.) En dosis única.

EFFECTOS SECUNDARIOS

En algunos casos pueden presentarse signos clínicos de dolor y/o reacción inflamatoria en el punto de inyección.

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito.

SOBREDOSIFICACIÓN

Amplio margen de seguridad. No obstante, de presentarse problemas de sobredosificación realizar un tratamiento sintomático. Los síntomas de intoxicación consisten en temblor, convulsiones y coma.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 30 días.

Leche: no usar.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ✦ Inyectar vía subcutánea.
- ✦ Utilizar equipo estéril de inyección y desinfectar la zona de aplicación.
- ✦ En dosis mayores a 10 ml se recomienda dividir la dosis y aplicar en uno o más puntos de inyección.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 100 y 500 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N074897

