



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

JABÓN ANTIPARASITARIO REVEEX

ANTIPARASITARIO

Jabón medicado



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



JABÓN ANTIPARASITARIO REVEEX, antiséptico y desodorante; especialmente diseñado para iniciar un plan de control efectivo contra pulgas, piojos y garrapatas. La acción insecticida fortalecida de la permetrina por su asociación con butóxido de piperonilo, ayuda a disminuir la carga poblacional de parásitos externos en animal con infestación que posean resistencia a la cipermetrina o a otro tipo de ectoparasitocidas.

COMPOSICIÓN

Cipermetrina	0,2 g
Butóxido de piperonilo.....	1 g
Aceite de pino.....	2 g
Base espumante para jabón c.s.p.....	100 g

MECANISMO DE ACCIÓN:

Cipermetrina: Es un insecticida que actúa sobre el sistema nervioso de los parásitos. Bloquea los canales de sodio en sus células nerviosas, causando hiperexcitación, parálisis y finalmente la muerte.

Butóxido de piperonilo: No mata directamente a los parásitos, pero potencia el efecto de la cipermetrina. Lo que hace es inhibir las enzimas que algunos insectos usan para desintoxicar el insecticida, asegurando que la cipermetrina haga su trabajo sin que los parásitos se recuperen.

Aceite de pino: Tiene propiedades antisépticas y repelentes. Ayuda a eliminar bacterias y hongos, además de actuar como un irritante para los parásitos, facilitando su eliminación.

Este jabón combina estos ingredientes para atacar a los parásitos de varias maneras: los paraliza, impide que se defiendan y los elimina, dejando la piel protegida.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Perro: parasitosis externas y limpieza. jabón antiparasitario reveex está indicado para la higiene periódica de perros con infestaciones ectoparasitarias por ácaro de sarna, piojo, garrapatas y pulgas.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

Vía tópica.

1. Mojar completamente el pelo y la piel con agua.
2. Frotar directamente con la pastilla de jabón en forma circular hasta obtener espuma, repartíendola uniformemente.
3. Evitar el contacto con los ojos y mucosas.
4. Dejar actuar por 10 minutos, aclarar con abundante agua y secar bien.
5. En caso de infestación masiva, repetir aplicaciones a los 7 y 15 días, o a criterio del médico veterinario.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Las piretrinas (cipermetrina) presentan escasa absorción sistémica y no se han descrito manifestaciones de toxicidad grave, habiéndose asociado a efectos adversos locales cutáneos como escozor, picor y de hipersensibilidad, los cuales son leves y de carácter transitorio.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar en gatos. Hipersensibilidad a algunos componentes de la fórmula o a algún piretroide natural o sintético o piretrina.

SOBREDOSIFICACIÓN

En casos de ingestión errónea accidental pueden presentarse manifestaciones de intolerancia gastrointestinal (epigastralgia, náusea, vómito, diarrea), ya que es muy poco tóxico. En todo caso deberá efectuarse lavado gástrico y adoptar medidas de soporte para contrarrestar los síntomas. En caso de reacción tópica, discontinuar el tratamiento y aplicar crema suavizante si hay reacción alérgica cutánea utilizar antihistamínicos orales o corticosteroides tópicos.

TIEMPO DE RETIRO

No procede.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- : En menores de dos meses debe evitarse su uso.
- : En caso de presentarse reacciones de hipersensibilidad debe cesarse el uso.
- : No aplicar sobre heridas ni mucosas, ni en casos de irritación persistente de la piel.
- : La Cipermetrina puede ser ligeramente irritante para los ojos, en caso de contacto accidental estos deben lavarse inmediatamente con abundante agua.
- : Debe advertirse a los pacientes con sarna que pueden presentar una exacerbación temporal de síntomas como prurito, escozor o ardor.
- : En los pacientes susceptibles de tener crisis asmática el uso de la Cipermetrina puede producir dificultad en la respiración.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 80 g.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN01II056771

