



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

KETOPROFEN 10% INYECTABLE

**ANTIINFLAMATORIO – ANALGÉSICO
ANTIPIRÉTICO**

Solución Inyectable



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



El ketoprofeno es un fármaco perteneciente al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), ampliamente utilizado en medicina veterinaria por sus propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas. Este medicamento se emplea en el tratamiento de múltiples procesos inflamatorios que afectan a animales tales como equinos, porcinos y bovinos. Entre las afecciones más comunes en las que se indica el uso de ketoprofeno se encuentran la mastitis, la metritis, la agalaxia y el manejo del dolor postoperatorio.

COMPOSICIÓN

Ketoprofeno..... 100 mg
Excipientes c.s.p.....1 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

El ketoprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) utilizado en medicina veterinaria para aliviar el dolor, reducir la inflamación y controlar la fiebre en animales. Su mecanismo de acción se basa en la inhibición de las enzimas ciclooxigenasas (COX-1 y COX-2), responsables de la síntesis de prostaglandinas, que son sustancias implicadas en la respuesta inflamatoria. Al disminuir la producción de prostaglandinas, el ketoprofeno ayuda a mejorar el bienestar del animal, facilitando su recuperación frente a lesiones, infecciones o intervenciones quirúrgicas.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Equinos:**

- Alivio de la inflamación y dolor asociados con trastornos musculoesqueléticos.
- Tratamiento sintomático del dolor visceral asociado al cólico. Dolor post-operatorio e inflamación.

Bovinos:

- Tratamiento antiinflamatorio y analgésico de enfermedades del sistema musculoesquelético.
- Reduce la pirexia y el distrés asociados con enfermedades respiratorias bacterianas cuando se usa junto con terapia antimicrobiana si corresponde.
- Reduce el edema mamario.
- Tratamiento antiinflamatorio, analgésico y antipirético en mamitis clínica aguda, junto con terapia antimicrobiana.

Porcinos:

- Reducción de la pirexia en enfermedades respiratorias.
- Tratamiento sintomático del síndrome de disgalaxia postparto, SDP (Síndrome Metritis Mastitis Agalaxia).

**ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA****Equinos:** Vía intravenosa.

Para uso en trastornos musculoesqueléticos: 2,2 mg de ketoprofeno/kg p.v., equivalente a 1 ml de medicamento/45 kg p.v. una vez al día durante un periodo de entre 3 y 5 días.

Para su uso en cólicos: 2,2 mg/kg p.v., equivalente a 1 ml de medicamento/45 kg p.v. en una única inyección. El tratamiento no se debe repetir hasta no haber llevado a cabo una reevaluación clínica del animal.

Bovino: Vía intravenosa o intramuscular.

Dosis recomendada: 3 mg de ketoprofeno/kg p.v., equivalente a 1 ml de medicamento/33 kg de p.v. una vez al día durante un periodo de entre 1 y 3 días.

Porcino: Vía intramuscular.

Dosis recomendada: 3 mg de ketoprofeno/kg p.v., equivalente a 1 ml de medicamento/33 kg de p.v. en dosis única.

EFFECTOS SECUNDARIOS

En muy raras ocasiones puede aparecer irritación o ulceración gástrica e intestinal.

CONTRAINDICACIONES

- × No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa y/o a alguno de los excipientes.
- × No usar en animales que padezcan enfermedades cardíacas, hepáticas o renales.
- × No usar en animales en los que exista la posibilidad de formación de úlceras gastrointestinales o hemorragia gastrointestinal a fin de no agravar su estado.
- × No usar cuando haya evidencia de discrasia sanguínea o trastornos de la coagulación sanguínea.
- × No administrar conjuntamente con otros antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o dentro de las 24 horas siguientes.
- × No administrar conjuntamente con corticosteroides, diuréticos ni anticoagulantes.
- × No usar en animales durante la gestación o la lactancia.

SOBREDOSIFICACIÓN

Producto con amplio margen de seguridad.

TIEMPO DE RETIRO

Bovino:

- Carne: 4 días. Leche: cero horas.

Porcino:

- Carne: 4 días.

Caballos:

- Carne: 4 días. Leche: Su uso no está autorizado en yeguas cuya leche se utiliza para consumo humano.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- Las personas con hipersensibilidad conocida al ketoprofeno y/o al alcohol bencílico deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.
- El tapón no debe puncionarse más de 45 veces. Cuando se traten grupos grandes de animales a la vez, use un dispositivo de dosificación automática.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, lavar abundantemente con agua. Si la irritación persiste consulte con un médico y muéstrele el prospecto o la etiqueta.
- Lavarse las manos tras utilizar el medicamento.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 50, 100, 250 y 500 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N0518792

