



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

LINCOMICINA-40

ANTIBACTERIANO

**Polvo para administración
en agua de bebida**



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



LINCOMICINA-40 se presenta como un polvo de administración oral, formulado específicamente para aves y cerdos. Su principio activo, la lincomicina hidrocloreto, actúa eficazmente en el tratamiento de la disentería porcina y en el control de la enteritis necrótica, brindando una solución confiable para la salud de sus animales.

COMPOSICIÓN

Lincomicina (hidrocloreto).....400 mg
Excipientes c.s.p.....1 g

MECANISMO DE ACCIÓN:

La lincomicina es un antibacteriano lincosamínico. Actúa inhibiendo la síntesis proteica al unirse a la subunidad 50S ribosomal dependiendo de la sensibilidad de los microorganismos y la concentración del antibacteriano, su actividad puede ser bactericida o bacteriostática y es específica frente a bacterias gram positivas y microorganismos anaerobios

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

**Porcino y aves.**

Porcino: tratamiento de la disentería porcina causada por cepas de *Brachyspira hyodysenteriae* sensibles a la lincomicina.

Aves : control de la enteritis necrótica causada por cepas de *Clostridium perfringens* sensibles a la lincomicina.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Administración en agua de bebida.

Se debe renovar el agua medicada cada 24 horas.

Porcino: administrar 5 – 10 mg de lincomicina por Kg de peso vivo y día, durante un mínimo de 5 días y un máximo de 10 días consecutivos (equivalente a 12.5 -25 mg de medicamento/kg pv/día)

Aves: administrar 3 – 6 mg de lincomicina por Kg de peso vivo y día, durante 7 días consecutivos (equivalente a 7.5 -15 mg de medicamento/kg pv/día).

El consumo de agua medicada depende de las condiciones fisiológicas y clínicas de los animales y de la época del año. Para asegurar una dosificación correcta, la concentración de lincomicina en el agua se ajustará teniendo en cuenta el consumo diario.

Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para evitar una dosificación insuficiente.

Según la dosis recomendada, el número y peso de los animales que deben recibir el tratamiento, se debe calcular la dosis diaria exacta de medicamentos aplicando la fórmula siguiente:

$$\frac{\text{g de medicamento}}{\text{litro de agua de bebida}} = \frac{\text{dosis de sustancia activa (mg/kg p.v./día)} \times \text{peso medio de los animales (kg)}}{\text{mg de sustancia activa en g de medicamento (mg/g)} \times \text{Consumo medio de agua (litros/día)}}$$

El agua medicada debe ser la única fuente de agua de bebida durante el periodo de tratamiento

EFFECTOS SECUNDARIOS

Se han observado de forma ocasional diarreas y/o inflamación leve e irritación del ano y/o la vulva; estos síntomas suelen ser transitorios. En rara ocasiones, los cerdos pueden presentar enrojecimiento de la piel y comportamiento irritable. Estos signos normalmente disminuyen en los 5 a 8 días posteriores a la interrupción del tratamiento.

CONTRAINDICACIONES

- × No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa.
- × No administrar en ningún caso a hámsteres, conejos, cobayas, chinchillas, équidos o rumiantes, ya que puede causar graves alteraciones gastrointestinales. No utilizar en otras especies de destino distintas a las propuestas.

SOBREDOSIFICACIÓN

Cerdos: en rara ocasiones, pueden presentar enrojecimiento de la piel y comportamiento irritable. Estos signos normalmente disminuyen en los 5 a 8 días posteriores a la interrupción del tratamiento.

Aves: a cinco veces la dosis recomendada y durante 21 días, no se evidenció ningún efecto relacionado con el medicamento.

TIEMPO DE RETIRO

Porcino

- **Carne:** cero días

Aves

- **Carne:** cero días

- **Huevos:** Su uso no está autorizado en aves cuyos huevos se utilizan para el consumo humano.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- Evitar la diseminación del polvo durante la incorporación del medicamento al agua.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, lavar abundantemente con agua.
- Usar un equipo de protección personal consistente en mascarilla antipolvo, guante, mono de trabajo y gafas de seguridad aprobadas al manipular el medicamento veterinario.
- Lavarse las manos tras utilizar el medicamento.
- No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento.
- El agua medicada debe ser la única fuente de agua de bebida durante el periodo de tratamiento.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto:

Bolsa de 100 g con 1 cucharilla dosificadora

Bolsa de 1 kg con 1 cucharilla dosificadora

Caja con 10 bolsas de 100 g y con 10 cucharillas dosificadoras

Caja con 50 bolsas de 100 g y con 50 cucharillas dosificadoras

Caja con 100 bolsas de 100 g y con 100 cucharillas dosificadoras

Caja con 5 bolsas de 1 kg y con 5 cucharillas dosificadoras

Caja con 10 bolsas de 1 kg y con 10 cucharillas dosificadoras

Caja con 25 bolsas de 1 kg y con 25 cucharillas dosificadoras.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana

N° de registro: INSAI2041PN33N058691

