



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

LINCOVEEX

ANTIBACTERIANO

Solución inyectable estéril



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



LINCOVEEX es una solución inyectable a base de dos antibióticos Lincomicina y Espectinomicina especialmente indicado para porcinos, bovinos, ovinos, caprinos, aves (gallinas y pavos), caninos y felinos.

COMPOSICIÓN

Lincomicina(clorhidrato).....	5 g
Espectinomicina (sulfato)	10 g
Excipientes c.s.p.....	100 mL

MECANISMO DE ACCIÓN:

La espectinomicina es un antibiótico bacteriostático, actúa inhibiendo la síntesis proteica bacteriana, al fijarse sobre la subunidad 30S del ribosoma. Perturba la ordenación del RNA mensajero y provoca una lectura incorrecta del código genético por el RNA de transferencia. Es activo frente a gérmenes Gram (+) y Gram (-) así como frente a micoplasmas: *Salmonella spp.*, *Pasteurella multocida.*, *Escherichia coli.*, *Mycoplasmas*.

La lincomicina presenta un mecanismo de acción y un espectro bacteriano muy semejante al de los macrólidos. Actúa inhibiendo la síntesis de las proteínas bacterianas al unirse a la subunidad 50S del ribosoma, impidiendo el acoplamiento de las moléculas del RNA de transferencia. Es primariamente bacteriostático, pero a altas concentraciones puede ser bactericida.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Caninos, porcinos, bovinos, caprinos, felinos, ovinos y aves.

Porcinos: Disenteria, enteropatía proliferativa (ileitis), Enteritis, Neumonía enzoótica, Artritis infecciosa.

Bovinos, ovinos y caprinos: Tratamiento de infecciones respiratorias, Micoplasmosis, Pederio.

Aves (gallinas y pavos): Micoplasmosis asociada con *E.coli*, Colera Aviar asociada a Pasteurelosis multocida.

Perros y gatos: Infecciones respiratorias, intestinales, urinarias, dérmicas causadas por gérmenes sensibles (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Bacteroides spp.*, *Clostridium spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Actinomyces spp.*, *Mycoplasma spp.*)



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía intramuscular.

Todas las especies: 10-20 mg de espectinomicina + 5-10 mg de lincomicina/kg p.v. (equivalente a 1-2 ml de LINCOVEEX /10 kg p.v.) por vía intramuscular cada 12 horas, durante 4-7 días.

EFFECTOS SECUNDARIOS

- ❑ Después de la administración IM puede presentarse dolor e irritación local.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a la lincomicina o a la espectinomicina.
- × No administrar a caballos, ya que la lincomicina produce colitis hemorrágica y diarrea con resultados muy graves.
- × No administrar a animales que padezcan infecciones preexistentes por *Monilia spp.*

SOBREDOSIFICACIÓN

En términos generales, la administración de una dosis equivalente a tres veces la terapéutica suele provocar como principal efecto adverso la irritación local.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 14 días.

Leche: No usar en animales cuya leche este destinada al consumo humano.

Huevos: No usar en aves ponedoras cuyos huevos estén destinados al consumo humano.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

No se han descrito.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en un rango de temperatura entre 15 a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: 20, 50, 100 y 250 mL.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N0511066

