



**LABORATORIOS
REVEEX DE VENEZUELA C.A.**

FICHA TÉCNICA

MASTIVEEX CON CEFALOSPORINA

ANTIMASTITICOS

Suspensión intramamaria



USO VETERINARIO

DESCRIPCIÓN



MASTIVEEX CON CEFALOSPORINA es una suspensión intramamaria destinada para el tratamiento y prevención de la mastitis clínica de las vacas lecheras lactantes asociada con *Staphylococcus coagulasa* negativos, *Streptococcus dysgalactiae* y *Escherichia coli*.

COMPOSICIÓN

Clorhidrato de ceftiofur	125 mg
Dexametasona fosfato sódico.....	1,5 mg
Excipientes c.s.p.....	10 g

MECANISMO DE ACCIÓN:

El ceftiofur consiste en inhibir la síntesis de la pared celular de las bacterias susceptibles, impidiendo su crecimiento y reproducción. Actúa contra bacterias grampositivas y gramnegativas, siendo especialmente eficaz contra las gramnegativas.

La Dexametasona ejerce acción antiinflamatoria mediante la inhibición de las fases tempranas y tardías de la inflamación. Tras la administración intramamaria, la prednisolona induce una reducción de la inflamación y consecuentemente del tamaño del cuarterón infectado y promueve la recuperación a la temperatura normal en animales infectados.

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES



Bovinos, ovinos y caprinos

Tratamiento de mastitis clínicas en vacas lecheras en lactación producidas por *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus coagulasa negativa*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis* y *Escherichia coli* sensibles a las cefalosporinas.



ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía intramamaria

- Infundir una (1) jeringa en cada cuarto afectado. Repita este tratamiento en 24 horas.
- Para la terapia de duración prolongada, se puede repetir el tratamiento una vez al día durante hasta 8 días consecutivos.

Tratamiento:

- 1) Lavar perfectamente las ubres con agua tibia que contenga un antiséptico adecuado para uso en lechería.
- 2) Secar perfectamente las ubres.
- 3) Ordeñar la ubre completamente.
- 4) Usando la torunda con alcohol que se proporciona, limpiar la punta de cada cuarto afectada usando una torunda separada para cada uno.
- 5) Seleccionar la longitud deseada de inserción (total o parcial) e insertar la punta en el canal del cuarto.
- 6) Empujar el émbolo para administrar todo el contenido.
- 7) Dar masaje al cuarto para distribuir la suspensión en la cisterna del cuarto.

Reinfección: Después de un tratamiento exitoso es posible que ocurra reinfección a menos que se haya practicado un buen manejo del hato, con medidas de limpieza, desinfección y seguridad mecánica. Es necesario observar cuidadosamente a las vacas afectadas para detectar la recurrencia de la infección y su posible diseminación a otros animales.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Ninguno observado.

CONTRAINDICACIONES

- × No administrar en animales con hipersensibilidad a las cefalosporinas.

SOBREDOSIFICACIÓN

Producto con amplio margen de seguridad.

TIEMPO DE RETIRO

1. La leche de las vacas durante el tratamiento (máximo ocho infusiones diarias) y la producida durante 72 horas después del último tratamiento no se debe usar para consumo humano.

2. Si se utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta hasta por ocho días consecutivos, tiempo de retiro carne de 4 días.
3. El uso de este producto de una manera distinta a lo indicado en la sección de dosis puede producir residuos violatorios.

PRECAUCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

- ☐ No utilizar las toallitas limpiadoras en pezones con heridas abiertas.
- ☐ El uso de este medicamento debe basarse en pruebas de susceptibilidad y tener en cuenta las políticas oficiales y locales en materia de antimicrobianos.
- ☐ La jeringa debe utilizarse sólo una vez para un pezón.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, en refrigeración.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

PRESENTACIÓN

Contenido neto: cajas que contienen 1 paquete de 4, 12 a 20 jeringas desechables de 10 g cada una.

Venta bajo prescripción del médico veterinario

Asesor Técnico: M.V. Rene Orellana
N° de registro: INSAI2041PN33N0518252

